

19 cm

REFOCO[®]

WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN

Abamectin.....5 g/kg
 Bacillus thuringiensis var. kurstaki.....15 g/kg
 Aditivos.....c.s.p 1 kg

Registro: PQUA N° 1582 - SENASA

Titular del registro, Importado
y Distribuido por:



Av. Benavides 1579, 7mo piso, Oficina 702, Edificio del Park II,
Lima 18- Perú. Telf.: (01) 253-6444. atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:
IPROCHEM COMPANY LIMITED
 35F, Guomao Business Mansion, 3005 Nanhu Rd,
 Luohu District, Shenzhen, China
 Telf: 86-755-82353001 Fax: 86-755-82225900

Contenido Neto: 1 kg

Lote N°:
 F. de Form:
 F. de Venc:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**

LOGO CAISAC
PANTONE 711 C

LOGO CAISAC
PANTONE 2945 C

19 cm

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
 "MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado ó repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice guantes, botas, respirador y ropa de protección para prevenir la exposición durante la preparación y aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Avermectinas
- En caso de ingestión: No debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. No inducir al vómito.
- En caso de inhalación retire a la persona del área contaminada hacia una zona de aire fresco. Conseguir atención médica de inmediato.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia por 15 minutos y acudir al médico.
- Si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón por 15 minutos.

En caso de EMERGENCIAS llamar a:
ESSALUD EN LINEA: 4118000 Opción 4
ANTÍDOTO: No tiene antídoto

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase cortándolo y dépositelo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Tóxico para las abejas y otros artrópodos benéficos, evitar la aplicación en época de floración.
- Tóxico para los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

REFOCO WP es un insecticida formulado a base de abamectin y Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki. El abamectin actúa principalmente por ingestión y contacto directo sobre ácaros e insectos, mostrando un excelente control. El mecanismo de acción de esta molécula afecta el movimiento y actividad de los insectos, causando parálisis y muerte. Las endotoxinas del Bacillus al ingresar al sistema digestivo, paralizan el mismo y el insecto deja de alimentarse y la muerte de este se produce luego de varios días.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Preparar una premezcla de REFOCO WP de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente aplicar hasta lograr una buena cobertura de las plantas. Es recomendable usar todo el caldo antes de las 5 horas siguientes.

USOS: "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	Kg/200 L	Kg/ha		
Espárrago	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2	-	10	0.01* N.A.**
	"Gusano perforador grande de la bellota"	<i>Heliothis virescens</i>	0.5-0.6	1.5-1.8	7	0.01* N.A.**

P.C: Periodo de carencia
 LMR: Límite máximo de residuos
 N.A: No aplica
 *Abamectina ** Bacillus thuringiensis var. Kurstaki

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Realizar dos aplicaciones por campaña rotando con insecticidas de diferente mecanismo de acción.

Las aplicaciones deberán realizarse al inicio de las infestaciones.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

REFOCO WP no se debe mezclar con productos alcalinos ni con aguas dura o con pH alcalino.

FITOTOXICIDAD

REFOCO WP no es fitotóxico usado a la dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.



26 cm