

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- **CUIDADO, EVITE EL CONTACTO. POSIBLE CARCINÓGENO.**

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Benzimidazoles.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar el paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; si la irritación es grave, buscar asistencia médica. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No se ha determinado antídoto específico.
- Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

**Teléfonos de emergencia:**  
**CICOTOX: (01) 328-7700**  
**ESSALUD: (01) 411-8000 opción 4**  
**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.: (01) 499-7831**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilizarlo triturándolo y/o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

# EXCELSIOR

## 500 SC

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**Suspensión concentrada (SC)**

**Composición:**

Carbendazim..... 500 g/L

Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Reg. PQUA N° 2536 - SENASA**

**Titular de Registro,**

**Importador y Distribuidor:**



**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.**  
 Av. Javier Prado Este N° 6726 Int. 301-A  
 Urb. Santa Patricia II Etapa,  
 La Molina, Lima, Perú  
 Teléfono: (01) 499-7831

**Formulado por:**

**POINT INTERNATIONAL LTD.**  
 42 St. Margarets Grove  
 Twickenham TW1 1JG  
 United Kingdom

**Contenido Neto: 1 L**

**N° de Lote:**

**Fecha de Formulación:**

**Fecha de Vencimiento:**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

• **EXCELSIOR 500 SC** es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa. Actúa sobre la división celular (mitosis de los hongos), básicamente sobre los microtúbulos, lo que causa que se detenga el crecimiento de estos patógenos.

• **EXCELSIOR 500 SC** se emplea diluido en agua limpia. Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada del producto en un balde con agua; luego vaciar al tanque de aplicación, completar el volumen de agua a utilizar y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

• **EXCELSIOR 500 SC** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras, pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor, etc) que se encuentre en perfecto estado de

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO     | PLAGA               |                                       | DOSIS<br>(mL/Cil - 200L) | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
|             | Nombre Común        | Nombre Científico                     |                          |              |              |
| VID         | "Podrición gris"    | <i>Botrytis cinerea</i>               | 300                      | 7            | 0.3          |
| AJI PÁPRIKA | "Podrición gris"    | <i>Botrytis cinerea</i>               | 300                      | 7            | 5            |
| TOMATE      | "Podrición gris"    | <i>Botrytis cinerea</i>               | 300                      | 7            | 0.5          |
| ARROZ       | "Quemado del arroz" | <i>Pyricularia oryzae</i>             | 300                      | 8            | 2            |
| PIMIENTO    | "Oidium"            | <i>Leveillula taurica</i>             | 300                      | 3            | 0.1          |
| ALCACHOFA   | "Podrición gris"    | <i>Botrytis cinerea</i>               | 300                      | 14           | 0.01         |
| PALTO       | "Antracnosis"       | <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> | 300                      | 14           | 0.1          |

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón).

PC: Período de carencia en días.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

**EXCELSIOR 500 SC** puede aplicarse en cualquier etapa fenológica del cultivo. Puede repetir la aplicación después de 20 días. Número máximo de aplicaciones: 2 aplicaciones por campaña/año.

**PERIODO DE REINGRESO**

Se puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

**COMPATIBILIDAD**

**EXCELSIOR 500SC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

No se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos cuando es usado según se recomienda.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

