

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es moderadamente peligroso. No ingerir.
- Es moderadamente irritante dermal. Evitar contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos. Evitar todo contacto directo y prolongado con los ojos.
- Este producto contiene hidrocarburo aromático. Evite inhalarlo. Inflamable.
- No permita el ingreso de niños, personas en general y animales a la zona tratada con este producto.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón y lave la ropa de protección alejada de la ropa de casa.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en un lugar aislado, fresco, seco y ventilado alejado de fuentes de calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Triazoles.
- En caso de intoxicación, detenga el trabajo, aleje al afectado de la zona de peligro, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón, incluyendo debajo de las uñas.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito a menos que lo recomiende el médico, administrar repetidamente carbón activado en abundante agua.
- Si existe la posibilidad de una toxicidad severa, considerar el lavado gástrico protegiendo las vías respiratorias.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar aireado alejado de la zona tratada, mantenerlo en reposo, si fuera necesario dar respiración artificial.

**Teléfonos de emergencia:**

**CICOTOX:** (01) 328-7700, **ESSALUD:** (01) 411-8000 opción 4  
**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.:** (01) 499-7831

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades

**mamba®**  
**250 EC**

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

**COMPOSICIÓN:**

Difenoconazole..... 250 g/L  
 Aditivos..... c.s.p. 1 L

**Reg. PQUA N° 2539 - SENASA**



Titular Del Registro, Importador y Distribuidor:  
**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.**  
 Av. Javier Prado Este N° 6726 Int. 301-A  
 Urb. Santa Patricia II Etapa,  
 La Molina, Lima, Perú  
 Teléfono: (01) 499-7831

Formulado por:  
**Point Agro - China Ltd.**  
 Wan Shi Town, Yixing,  
 Jiangsu 214217. China

Contenido Neto: **1 L**

N° de Lote:  
 Fecha de Formulación  
 Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO**



**INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**MAMBA 250 EC** es un fungicida que pertenece al grupo químico de los Triazoles. Es un inhibidor de la síntesis de ergosterol que es una sustancia predominante en las paredes celulares de los hongos y tiene la función de dar fluidez e integridad a la membrana, permite además la función apropiada de muchas enzimas unidas a ella y al favorecer a la función de la quitina sintetasa permite el crecimiento y división celular del hongo.

Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con una mochila manual o motorizada buscando obtener un tamaño de gota fina para una adecuada cobertura del cultivo.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO   | PLAGA               |                               | DOSIS     |       | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|---------------------|-------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------|
|           | Nombre común        | Nombre científico             | ml/200 L  | ml/Ha |              |              |
| Vid       | "Oidium"            | <i>Erysiphe necator</i>       | 150       | -     | 21           | 3            |
| Pimiento  | "Oidium"            | <i>Leveillula taurica</i>     | 150       | -     | 7            | 0.8          |
| Zapallo   | "Oidium"            | <i>Erysiphe cichoracearum</i> | 150       | -     | 7            | 0.2          |
| Alcachofa | "Oidium"            | <i>Leveillula taurica</i>     | 150 - 200 | -     | 14           | 1            |
| Espárrago | "Roya"              | <i>Puccinia asparagi</i>      | -         | 400   | 7            | 0.03         |
|           | "Mancha púrpura"    | <i>Stemphylium vesicarium</i> | 150       | -     | 7            | 0.03         |
| Arroz     | "Chupadera fungosa" | <i>Rhizoctonia solani</i>     | -         | 300   | 28           | 3            |
| Café      | "Roya del cafeto"   | <i>Hemileia vastatrix</i>     | 300 - 500 | -     | 21           | 0.05         |
| Cebolla   | "Alternariosis"     | <i>Alternaria porri</i>       | 150 - 200 | -     | 7            | 0.05         |

**LMR:** Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm).

**PC:** Período de Carencia en días.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

En zonas endémicas de la enfermedad aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para su desarrollo o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Aplicar **MAMBA 250 EC** una vez por campaña como máximo.

**PERIODO DE REINGRESO**

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizado la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**MAMBA 250 EC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



TRIPLE LAVADO  
 PANTONE 555 C PANTONE 639 C

PICTOGRAMA INFLAMABLE  
 PANTONE 485 C

BANDA TOXICOLÓGICA  
 PANTONE YELLOW C