

Longitud Total 28.9 cm.

Olympik®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:
Imidacloprid..... 350 g/L
Aditivos..... csp 1/L

Reg. PQUA N° 2538-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



Agro Klinge S.A.
Calle René Descartes N° 311,
Urb. Santa Raquel 2° Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf.: 612-6505, Fax: 348-1020
R.U.C.: 2050704217

Formulado por:
Ningbo Generic Chemicals Co., Ltd.
Room 10-6, Shida Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China

Contenido Neto: 1L

Lote N°
Fecha de Producción:
Fecha de Vencimiento:
® Marca registrada

NO INFLAMABLE



NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forajidos.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación para ingresar al área tratada en los primeros 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Neonicotinoide.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muestrele copia de esta etiqueta.
- Su ingestión produce síntomas de intoxicación como fatiga, temblores, calambres, dificultad para el movimiento y dificultad para la respiración. En lo posible dar de beber bastante agua. No administrar leche ni aceites. Provocar el vómito introduciendo un dedo a la garganta o dando de beber agua con sal.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

-No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

INDICACIONES AL MÉDICO: El tratamiento será sintomático. No existe ANTÍDOTO específico.

Teléfono de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398. ESSALUD: 411-8000 Op. 4, Agro Klinge S.A.: (01) 6126565

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice el frutero o perforándolo, y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: Olympik es un insecticida sistémico, que actúa por contacto e ingestión, de largo efecto residual. Olympik es rápidamente absorbido por el follaje y distribuido por toda la planta, incluyendo los insectos picadores-chupadores y mastigadores que dañan brotes, yemas, aplicaciones foliares: Aplicar en pulverizaciones previa mezcla con agua, empleando equipos de aspersión terrestre, en forma uniforme, procurando cubrir todo el follaje.

APLICACIONES EN "DRENCH": Diluir la dosis recomendada del insecticida en la cantidad necesaria de agua y aplicar directamente a la zona de la raíz de la planta.

USO ESPECÍFICO Y DOSIS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	Foliar ml/cil 200 L	Drench L/ha		
TOMATE	"Mosca blanca"	Bemisia tabaci	100-150	0,75	23	0,5
	"Caracha"	Protophysa longifolia	150-200	---	---	---
ALGODÓN	"Pulgón"	Aphis gossypii	75-120	---	7	3
MANCARNÍ	"Pulgón"	Toxoptera aurantii	100-150	---	7	1
ESPÁRRAGO	"Trips"	Thrips tabaci	150-200	1,5	7	0,05
	"Mezquita de los brotes"	Protophysa longifolia	150-200	1,5	---	---
PALTO	"Quersa del Palto"	Flortina florinae	150-200	---	7	1
ARRCZ	"Sogata"	Taposode myzicolus	75-100	---	21	1,5

P.C.=Período de carencia

LMR.=Límite máximo de residuos

VOLUMEN DE APLICACIÓN: Utilizar la cantidad de agua suficiente para una buena cobertura del cultivo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Las aplicaciones foliares y en "Drench" se realizarán cuando se observe la presencia de la plaga. En casos de reinfestación, en los cultivos de tomate y espárrago, repetir la aplicación (foliar) con intervalos de 8 a 10 días. Realizar un máximo de 2 aplicaciones espaciales y una de "Drench".

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

FITOTOXICIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".



Altura Total 13.5 cm.

Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

09 cm