

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIONES

-El producto es peligroso si se ingiere. Evitar su ingestión.

-Peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo y la dispersión.

-Moderado irritante ocular.

-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

-Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos,medicinas, bebidas ni forrajes.

-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua.

-Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.

PRIMEROS AUXILIOS

-Grupo químico: Neonicotinoides.

-En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente. Lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta o la hoja de información adjunta.

-En caso de contacto con los ojos lávelos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lávelase con abundante agua y jabón.

-En caso de inhalación llevar al paciente a un lugar aireado alejado de la zona tratada.

-En caso de ingestión no inducir al vómito a menos que lo recomiende el médico.

-No dar de beber nada si la persona esta inconsciente.

-Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Telefonos de Emergencia:

INSUMOS AGRICOLAS PERUANOS: (01) 499-7831

ESSALUD: (01) 411-8000 opción 4 / CICOTOX: (01) 328-7700

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

-Después de usar el contenido, destruya este envase, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por la autoridad local para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

-Tóxico para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.

-Peligroso para organismos acuáticos.

-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos envases vacíos.

-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

-No permitir animales en el área tratada.

-Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.

-El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

-En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	g/cil	Kg/Ha		
Algodón	“Mosca blanca”	<i>Bemisia tabaci</i>	40-50	0.1-0.125	14	0.5
Espárrago	“Mosquilla de los brotes”	<i>Prodioplosis longifila</i>	40-60	0.12-0.18	7	0.01
Pimiento	“Mosca blanca”	<i>Bemisia tabaci</i>	30-50	0.06-0.1	7	0.3
Palto	“Queresa del palto”	<i>Fiorinia florinae</i>	30-50	0.06-0.1	14	0.01

PC: Periodo de carencia L.M.R: Límite Máximo de Residuos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PREMIO 70 WP es un insecticida que presenta como ingrediente activo al acetamiprid que pertenece al grupo de los neonicotinoides. Presenta una acción sistémica, de contacto y translaminar. Es absorbido rápidamente por el follaje y su penetración asegura una rápida residualidad.

PREMIO 70 WP afecta el sistema nervioso de los insectos causándoles la muerte; además tiene un efecto sobre huevos, ninfas y adultos de insectos.

Controla una gama de insectos plagas de hortalizas, flores, cítricos, frutales, algodón y plantas ornamentales. Controla mosca blanca, áfidos, trips y orugas minadoras de hoja, también tiene efecto de control sobre algunas especies de lepidópteros, coleópteros e isópteros.

Las aplicaciones de PREMIO 70 WP se realizan en campo abierto y en condiciones de invernadero requiriendo para ello la utilización de equipos de protección. Siempre se debe mezclar la dosis recomendada en la etiqueta sobre agua limpia (el volumen de agua depende de cada cultivo y el momento fenológico, valor referencial es 400 l/ha). Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Los momentos de aplicación van a depender del nivel de daño económico.

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña

PERIODO DE REINGRESO.-

Se puede ingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD.- PREMIO 70 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD.- PREMIO 70 WP no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL.- El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

PREMIO[®]

70WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Acetamiprid..... 700 g/Kg

Aditivos.....c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 2540 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.

Av. Javier Prado Este N° 6726 Int. 301-A

Urb. Santa Patricia II Etapa,

La Molina, Lima, Perú

Teléfono: (01) 499-7831

FORMULADOR:

POINT AGRO-CHINA LTD

Wan Shi, Yixing,

Jiangsu, 214217 China

CONTENIDO NETO: 200g

Lote No.:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

BandaPantone Yellow C