BON A TIRER

CARTONNAGES D'AUCH Z.I. Engachies - BP 517 32021 AUCH CEDEX 9 - Tél. 05 62 60 63 12

Date	20 - 06 - 2019 | BAT-A9DM
Dossier	OF : 999

Désignation : 2051116-06-2019_FA_UPL_LABEL_NOVICURE		
Code Article : 8290102001007		Quantité : 0 pièces
Tracé Réf. : 02001	Poses : 02	Dimensions : 145x70x250 mm
Carton : 400g/m2 CUK: COUCHE PURE PATE KRAFT		
Vernis en ligne : **Recto :** UV Brillant / **Verso :**		
Vernis hors ligne : **Recto :** / **Verso :**		

Encres : Cyan, Magenta, Yellow, Black, Vernis

Encres techniques : Non imprimées lors du tirage — Artos Cut, Artos Crease

Pour un retirage à l'identique (sans envoi de BAT), merci de nous communiquer la référence 'BAT-A9DM' sur votre bon de commande.

Date et signature :

Ce BAT valide la totalité du fichier à imprimer sauf le rendu couleur.
Le rendu couleur ne peut être validé que par une épreuve fiable avec gamme de controle.

Etiqueta CUPROFIX DISPERSS 42 WG CAJA 1kg.pdf 27/07/21 09:00 AM

ET. PQUA No. 2243-SENASAV001-1kg

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO". "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depósitela en el lugar de destino dispuesto por la autoridadcompetente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- "Tóxico para abejas y artrópodos benéficos".
- "No aplicar en época de floración del cultivo".
- "No aplicar en presencia de polinizadores".
- "No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños".
- "Aplicar temprano en las mañana o las tardes"
- "Evitar la deriva por el viento".
- "Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas".
- "Peligroso para organismos acuáticos".
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto".
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros".
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre".
- "No permitir animales en el área tratada".
- "El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".
- "El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables".
- "En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas".

CUPROFIX DISPERSS 42 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Mancozeb ..... **300 g/kg**
Copper (Bordeaux mixture) ..... **120 g/kg**
Aditivos ..... **c.s.p. 1 kg**

Reg. PQUA No. 2243-SENASA

Titular de Registro:
ARYSTA LIFESCIENCE PERU S.A.C.
Jr. Caracas Nro. 2226 Fnd. Oyague (altura cdra 3 San Felipe) Jesús María - Lima.
Teléfono (01) 5137200

Formulador:
CEREXAGRI.
Siége social. Paec St Christophe - Galilée 3 Niveau 1 - 10 avenue de l´Enterprise 95863 Cergy Pontoise Cedex - FRANCE.
tel. +33(0)1 30 178800

Importador y distribuidor:
FARMAGRO S.A.
Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos-Lima
Teléfono: (01) 6141500 Fax (01) 6141517

Fecha de Formulación:
No. de Lote:
CONTENIDO NETO: **1 Kg**
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
CUPROFIX DISPERSS 42 WG es un fungicida de contacto o preventivo. Actúa formando una capa protectora sobre el follaje de los cultivos. Inhibe la germinación de esporas y detiene el crecimiento del tubogerminativo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
La aplicación es por aspersión foliar terrestre. Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad de agua que va a utilizar, agregar la dosis requerida de **CUPROFIX DISPERSS 42 WG**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, mantener agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

Cultivo	Plaga: Nombre común	Plaga: Nombre científico	Dosis (kg/200L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
Vid (*Vitis vinifera*)	Mildiu	*Plasmopara viticola*	0.5 - 0.75	28	* 5.0 ** 50.0
Papa (*Solanum tuberosum*)	Hielo (Rancha)	*Phytophthora infestans*	1.0 - 1.25	3	* 0.3 ** 5.0
Tomate (*Solanum lycopersicum*)	Hielo (Rancha)	*Phytophthora infestans*	1.0 - 1.25	25	* 3.0 ** 5.0

* Mancozeb ** Copper
P.C.: Periodo de carencia (días)
L.M.R.: Límie máximo de residuos (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar el producto en etapa de maduración de la papa (3 meses), desarrollo vegetativo del tomate y vid, y cuando se observe los primeros síntomas de la plaga en el cultivo o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de los mismos.
Realizar 2 aplicaciones por campaña con un intervalo entre aplicación de 10 a 15 días.

PERIODO DE REINGRESO
Reingresar al área tratada después de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD
Es compatible con plaguicidas comúnmente usados en los cultivos indicados en la etiqueta. Sin embargo, se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad antes de utilizar con otros productos.

FITOTOXICIDAD
CUPROFIX DISPERSS 42 WG no es fitotóxico si se siguen las recomendaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas a ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo Químico: Carbamate e Inorganic compound.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
Teléf. del titular: (01) 5137200
CISPROQUIM: 080-050-847

8290102001007

2051116-A (Tech. Ref.) - EMB 81140