

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- * Este producto es DAÑINO. No ingerir.
- * Peligroso si es inhalado (evite respirar).
- * Causa irritación moderada a los ojos.
- * No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- * Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- * Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- * No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- * Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- * Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- * Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- * Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Pyrethroid, Neonicotinoid y Neonicotinoid.

- * No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- * En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- * En caso de ingestión, no inducir al vomito sin supervisión medica. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- * En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- * En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- * En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

- * ESSALUD: 0800-10-828 (Línea gratuita).
- * CICOTOX: 0-800-1-3040.
- * SICURO S.A.C.: 261-5227, CISPROQUIM: 0800-50-847.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- * Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin".
- * "Devolva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado".
- * "Realizar obligatoriamente el triple lavado al centro de acopio autorizado"
- * "Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase".

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- * En el punto sobre medidas para la protección y conservación del ambiente considerar las siguientes frases:
- * Peligroso para las abejas.
- * No aplicaren época de floración del cultivo.
- * No aplicar en presencia de polinizadores.
- * No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- * Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. "Evitar la deriva por el viento".
- * Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- * "Peligroso para organismos acuáticos".
- * "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- * "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto".
- * "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros".
- * "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". No permitir animales en el área tratada".
- * "El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".
- * "El producto no debe aplicarse en zonas con napas frías superficiales o en suelos altamente permeables".
- * En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



RUTEL

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

Suspension Concentrado (SC)

Composición:

Bifenthrin	50 g/L
Imidacloprid	200 g/L
Lambda-cyhalothrin.....	75 g/L
Aditivos	csp.1 L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:

SICURO S.A.C.

Direcion: Jr. Sáenz Peña 344 Dpto. 105, Magdalena del Mar, Lima - Perú

Telf: +(511) 363-8659, 261-5227

Formulado por:

NOVA S.A.

Dirección: Ruta Nac. N°9 km 373.9 - 2500, Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina.

Telf: (03471)-422312.

Importador:

SICURO S.A.C.

Direcion: Jr. Sáenz Peña 344 Dpto. 105, Magdalena del Mar, Lima - Perú

Telf: +(511) 363-8659, 261-5227

Contenido Neto: 60 L

Lote N°.
F. de Form.
F. de Venc.

NO EXPLOSIVO



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

MODERADAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RUTEL es un Insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión que afecta la conducción de los impulsos nerviosos en los insectos. Actúa en dos puntos distintos del metabolismo del sistema nervioso de los insectos: los receptores de acetilcolina de las sinapsis y en los canales de sodio de mas membranas y resulta una rápida pérdida de control muscular, parálisis y muerte.

Se puede aplicar con cualquier equipo de pulverización terrestre. Antes de aplicar, asegúrense que el agitador del tanque este operativo, el mismo que debe mantenerse en funcionamiento durante el período de aplicación. Regule el agua a un pH entre 5.5 y 6. Vierta el agua hasta la mitad de la capacidad del tanque del pulverizador con el agitador en funcionamiento. Complete con agua hasta el nivel deseado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	CONTROL DE PLAGA		DOSIS (L/ha)	LMR (ppm)	P.C. (días)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Cebolla	Thrips	Thrips tabaci	0.25	0.01*, 0.1**, 0.01***	21
Tomate	Mosquilla de los brotes	Protoplasia longifolia	0.28	0.3*, 0.5**, 0.1***	
Mandarina	Queresia coma	Lepidosaphes beckli	0.575	0.05*, 1**, 0.2***	
Granada	Cochinilla harinosa	Planococcus citri	0.216	0.01*, 0.01**, 0.01***	
Pimiento	Gusano perforador grande de la bellota	Heliothis virescens	0.23	0.5*, 1**, 0.1***	
Palto	Mosca blanca	Bemisia tabaci	0.42	0.01*, 1.0**, 0.01***	
Palto	Queresia	Florina forinae	0.40	0.01*, 1.0**, 0.01***	
Esparrago	Mosquilla	Protoplasia longifolia	0.37	0.05*, 0.05**, 0.02***	
Esparrago	Gusano silbador	Heliothis virescens	0.37	0.05*, 0.05**, 0.02***	
Esparrago	Thrips	Thrips tabaci	0.37	0.05*, 0.05**, 0.02***	

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

Bifenthrin *

Imidacloprid **

Lambda-cyhalothrin ***

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se puede realizar máximo 1 sola aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se emplea a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

