

Medidas: 19.3 cm (ancho) x 6.3 cm (alto)

ET. PQUA No. 2100-SENASAV001-0.25

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA)  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es "DAÑINO". No ingerir.
- Evita contacto con la piel y la ropa.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Pyrethroid + Phenylpyrazole.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación conseguir asistencia médica y presentar etiqueta y ficha informativa del producto.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106  
Teléf. del titular: (01) 5137200  
CISPROQUIM: 080-050-847

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# RASTREADOR

## 300 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

#### COMPOSICIÓN:

Fipronil .....175 g/L  
Beta-cypermethrin .....125 g/L  
Aditivos.....c.s.p 1L

Reg. PQUA N° 2100 - SENASA

#### Titular de Registro:

ARYSTA LIFESCIENCE PERU S.A.C.  
Jr. Caracas Nro. 2226 Fnd. Oyague (altura cdra 3 San Felipe) Jesús María - Lima.  
Teléfono (01) 5137200

#### Formulador:

UPL LIMITED. Uniphos House, Madhu Park 11th Road,  
Khar (West), Mumbai (Bombay) 400 052, India  
Tel. 91-22-2646 8000 Fax 91-22-2604 100 www.uplonline.com

#### Importador y distribuidor:

DEMETRA GROUP SAC  
Calle Gamma Mz. B-7 L-19 Urb. Bocanegra Callao, Lima - PERÚ  
Teléfono: (51) 5754454

Fecha de Formulación:

No. de Lote:

CONTENIDO NETO: 0.25L

Fecha de vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- RASTREADOR 300 SC es una mezcla de insecticida de Fipronil + Beta-cypermethrin. El fipronil es una molécula extremadamente activa, actúa por contacto e ingestión, interfiriendo fuertemente con el sistema nervioso central de los insectos durante su crecimiento de estado larval causándoles la muerte. El beta-cypermethrin es una molécula no-sistémica, actúa por contacto e ingestión afectando el sistema nervioso central y periférico de los insectos. Debido al modo de acción de RASTREADOR 300 SC, tanto los adultos como las fases larvarias de los insectos son controlados.
- RASTREADOR 300 SC puede aplicarse en campo abierto o invernadero, y se aplica en forma de aspersión mezclada con agua. Llenar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad, luego agregar la dosis correspondiente de RASTREADOR 300 SC y finalmente completar el volumen total del tanque siempre con los agitadores en marcha para lograr una solución homogénea.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis L/200 L	P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico			
Papa (Solanum tuberosum)	Gorgop de los andes	Phenotypipes vorax	0.2 - 0.25	21	*0.02 **0.05
Arroz (Oryza sativa)	Mosca miradora del arroz	Hydrellia waltii	0.2 - 0.25	32	*0.01 **2.0
Tomate (Solanum lycopersicum)	Mosquilla de los brótes	Prodidolus longitarsis	0.25	23	*0.005 **0.2

P.C.: Período de carencia en días L.M.R.: Límite máximo de residuos en ppm. \*fipronil \*\*beta-cyperm.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar el producto a la aparición de las primeras infestaciones y cuando las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo de la plaga. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña considerando como máximo sólo una campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO: Reingresar a la zona tratada después de 24 horas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

