

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA)
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es "DAÑINO". No ingerir.
- Evita contacto con la piel y la ropa.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Pyretroid + Phenylpyrazole.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación conseguir asistencia médica y presentar etiqueta y ficha informativa del producto.

TÉLFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
Teléf. del titular: +511 7194085
CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- "Tóxico para abejas y artrópodos benéficos".
- "Peligroso para organismos acuáticos".
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
- "En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas".

RASTREADOR

300 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Fipronil175 g/L
Beta-cypermethrin125 g/L
Aditivosc.s.p 1L

Reg. PQUA N° 2100 - SENASA

Titular del Registro:

UNITED PHOSPHORUS PERU S.A.C.
Calle Los tulipanes N° 147, Of. 304, Surco, Lima 33 - Perú. Tel.: +511 7194085

Formulador:

UPL LIMITED, Uniphos House, Madhu Park 11th Road,
Khar (West), Mumbai (Bombay) 400 052, India
Tel. 91-22-2646 8000 Fax 91-22-2604 100 www.uplonline.com

Importado y distribuido por:

DEMETRA GROUP SAC
Calle Gamma Mz. B-7 L-19 Urb. Rocanegra Callao, Lima - PERÚ
Teléfono: (51) 5754454

Fecha de Formulación:

No. de Lote:

CONTENIDO NETO: 0.25L

Fecha de vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **RASTREADOR 300 SC** es una mezcla de insecticida de Fipronil + Beta-cypermethrin. El fipronil es una molécula extremadamente activa, actúa por contacto e ingestión, interfiriendo fuertemente con el sistema nervioso central de los insectos durante su crecimiento de estado larval causándoles la muerte. El beta-cypermethrin es una molécula no-sistémica, actúa por contacto e ingestión afectando el sistema nervioso central y periférico de los insectos. Debido al modo de acción de **RASTREADOR 300 SC**, tanto los adultos como las fases larvarias de los insectos son controlados.

- **RASTREADOR 300 SC** puede aplicarse en campo abierto o invernadero, y se aplica en forma de aspersión mezclada con agua. Llenar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad, luego agregar la dosis correspondiente de **RASTREADOR 300 SC** y finalmente completar el volumen total del tanque siempre con los agitadores en marcha para lograr una solución homogénea.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis L/200 L	P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico			
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Gorgopio de los andes	<i>Pieris brassicae</i>	0.2 - 0.25	21	"0.02 **0.05
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Mosca minadora del arroz	<i>Hydrilla waltii</i>	0.2 - 0.25	32	"0.01 **2.0
Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Mosquilla de las bridas	<i>Protoplasma longitarsis</i>	0.25	23	"0.005 **0.2

P.C.: Periodo de carencia en días L.M.R.: Límite máximo de residuos en ppm. *fipronil **beta-cyperm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar el producto a la aparición de las primeras infestaciones y cuando las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo de la plaga. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña considerando como máximo sólo una campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO: Reingresar a la zona tratada después de 24 horas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

