


Fórmula estructural:



Formula empírica: C12H4Cl2F6N4OS

Peso molecular: 437.1 g/mol

Propiedades físicas y químicas del producto formulado:

Estado físico: Líquido.

Color: Blanco

pH: 2.5 +/- 1 a 20°C

pH: 2.3 ± 1 a 20°C
Densidad relativa: 1.05 g/ml a 20°C

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

Explosividad: No explosivo

Reactividad: No reactivo

Reactividad: No reactivo
HDPE

HDPE.

Capacidad y clase de los envases: 1 litro, 5 litros, 250 ml, 200 ml.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

REGENT SC es un insecticida sistémico del grupo Fenil Pirazol.

Se aplica en pulverizaciones foliares previa mezcla en agua siendo recomendable hacer una pre-mezcla en un volumen menor de agua, agitando continuamente, luego se agrega el resto de agua hasta completar el volumen requerido. Se aplica con equipos terrestres como pulverizadoras manuales, a motor o tractor. Actúa por contacto e ingestión a nivel del sistema nervioso central de los insectos plaga.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CULTIVO	PLAGAS			DOSIS			PC ^a días	LWR ^b (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	I/ha	%	I/cil			
ALGODONERO	Picudo Trips	<i>Anthonomus vestitus</i> <i>Thrips fabae</i>	0.3-0.35	0.075 - 0.0875	0.15-0.175	14	0.005	
	Gorgojo de los Andes	<i>Premnotypus spp</i>	0.4-0.5	0.1 - 0.125	0.2-0.25	14		0.02
PAPA	Escarabajo de hojas	<i>Diabrotica viridula</i>	0.25-0.3	0.0625- 0.075	0.125-0.15	14		
TOMATE	Puquita saltona	<i>Epirrhia spp</i>						
	Mosquilla o caracha	<i>Prodioplosis longifolia</i>	0.3-0.5	0.075 - 0.125	0.15-0.25	21	0.005	
VID	Capacho	<i>Anomala sp</i>						
	Cheje	<i>Amphiridius sp</i>	0.3	0.075	0.15	21	0.005	
MARIGOLD	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifolia</i>						
	Cigarita marrón	<i>Ruzelliana sp</i>	0.35-0.45	0.0875 - 0.112	0.175-0.225	21	0.002	
COL	Trips	<i>Thrips sp</i>						
	Gusano de la col	<i>Plutella xylostella</i>	0.2-0.25	0.05-0.0625	0.1-0.125	14	0.02	
COLIFLOR								
ESPÁRRAGO	Mosquilla o caracha	<i>Prodioplosis longifolia</i>	0.45-0.5	0.112-0.125	0.225-0.26	21	0.01	
PIMIENTO	Mosquilla o caracha	<i>Prodioplosis longifolia</i>	0.5	0.1	—	21	0.005	
ARROZ	Mosca minadora del arroz	<i>Hydrellia wirthi</i>	0.2-0.3	0.06-0.1	0.132	15	0.01	

LMR** = Límite máximo de residuos

Utilizar la dosis en concentración cuando se aplica con pulverizadora manual de mochila. En caso de aplicar con atomizadora de espalda a motor, emplear la dosis en l/ha previa calibración de los equipos de aplicación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar la aplicación en forma general cuando comienza el ataque de insectos previa evaluación de la plaga considerando el nivel de daño económico.

La aplicación debe realizarse en horas de poca incidencia solar y en ausencia de vientos fuertes y lluvias.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas

THE



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO