

PLAGUICIDA QUÍMICA DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Fluazinam.....	200 g/L
Dimethomorph	200 g/L
Aditivos	c.s.p. 1 Litro

Registro PQUA N° XXXX - SENASA

Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of. 503
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01)641-0000

Formulado por:
ADAMA Makhteshim Ltd.
Northern Industrial Zone
P.O. Box 60
Be'er-Sheva 8410001, Israel.

CONTENIDO NETO: **4 Litros**

Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



ADAMA

NO CORROSIVO

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión)
- Evitar el contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: phenylpyridinamine + morpholine
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y mostrar la etiqueta y hoja informativa adjunta.
- Telefonos de emergencia: CISPROQUIM 080-050-847; CICOTOX (01) 328-7700; ESSALUD en línea (01) 411-8000 anexo 4; ADAMA Agricultrice Perú S.A. (01) 641-0000.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilcelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Javari SC es un fungicida con acción preventiva y curativa que combina dos ingredientes activos con distinto mecanismos y modo de acción, por lo que resulta activo en diferentes fases del ciclo de la "rancha" en el cultivo de papa.

Aplicar al follaje con equipo de pulverización terrestre, boquillas de cono y gota fina. Previo a la aplicación asegurarse que el equipo se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado. Agitar bien el envase antes de abrir.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
		(L/200 L)	(L/ha)		
Papa	"Rancha" <i>Phytophthora infestans</i>	0.75 - 1.0	1.7 - 2.3	7	0.02 ¹ 0.05 ²

P.C.: Periodo de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos
1- fluazinam/2- dimethomorph

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

FRECUENCIA Y FORMA DE APLICACIÓN
Se recomienda hacer tres (03) aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 10 días entre aplicaciones, considerando una campaña al año. No realizar más de 3 aplicaciones al año.
Realizar la primera aplicación cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo del patógeno.
En el cultivo de papa, **Javari SC** puede ser aplicado desde la etapa de desarrollo de hojas hasta la senescencia.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

La compatibilidad de **Javari SC** con otros plaguicidas o fertilizantes no ha sido confirmada localmente. En caso de mezcla con otros productos se recomienda bajo responsabilidad del usuario realizar pruebas previas a pequeña escala para determinar la compatibilidad de la mezcla a usar.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



CARA

CONTRACARA

Dimensiones: 140 mm x 150 mm

ESTA ETIQUETA REQUIERE HOJA INFORMATIVA