**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión)
- Evitar el contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese , lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: phenylpyridinamine + morpholine
  No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por la oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado . Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Teléfonos de emergencia: CISPROQUIM 080-050-847; CICOTOX (01)328-7700; ESSALUD en línea (01) 411-8000 anexo 4; ADAMA Agriculture Perú S.A. (01)641-0000.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o el suelos altamente permeables
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# Javari® SC

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

## SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Fluazinam ..... 200 g/L
Dimethomorph ..... 200 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° XXXX-SENASA


Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
**ADAMA Agriculture Perú S.A.**
Av. El Derby N° 254 Of 503.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01)641-0000

Formulado por:
**ADAMA Andina B.V.**
**Sucursal Colombia.**
Calle 1 C N° 7 -53 Int Zona Franca
Barranquilla, Colombia.


CONTENIDO NETO: **200 Litros**
Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

ADAMA

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**Javari SC** es un fungicida con acción preventiva y curativa que combina dos ingredientes activos con distinto mecanismo y modo de acción, por lo que resulta activo en diferentes fases del ciclo de la "rancha" en el cultivo de papa. Aplicar al follaje con equipo de pulverización terrestre, boquillas de cono y gota fina. Previo a la aplicación asegurarse que el equipo se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado. Agitar bien el envase antes de abrir.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO | ENFERMEDAD | DOSIS (L/200 L) | DOSIS (L/ha) | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Papa | "Rancha" *Phytophthora infestans* | 0.75 - 1.0 | 1.7 - 2.3 | 7 | 0.02[1] 0.05[2] |

P.C.: Periodo de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos
1- fluazinam / 2- dimethomorph

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda hasta tres (03) aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 10 días entre aplicaciones, considerando una campaña al año. No realizar mas de 3 aplicaciones al año.
Realizar la primera aplicación cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo del patógeno.
En el cultivo de papa, **JAVARI SC** puede ser aplicado desde la etapa de desarrollo de hojas hasta la senescencia.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

La compatibilidad de **JAVARI SC** con otros plaguicidas o fertilizantes no ha sido confirmada localmente. En caso de mezcla con otros productos se recomienda bajo responsabilidad del usuario realizar pruebas previas a pequeña escala para determinar la compatibilidad de la mezcla a usar.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

Dimensiones: 200 mm x 330 mm