




LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
Durante su manipuleo (preparación de la mezcla y aplicación) use máscara, guantes protectores y ropa apropiada. No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Terminada la labor, lavarse con agua y jabón cambiarse de ropa.
Evitar la contaminación de cultivos alimenticios, forrajeros y fuentes de agua. Almacenarlo en sus envases lejos del alcance de los niños y animales domésticos.
No se debe almacenar ni transportar conjuntamente con productos alimenticios, forrajeros, medicinas y bebidas. No aplicar con temperaturas mayores de 30°C.
Causa irritación moderada a los ojos.
El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
Si se ingiere realizar un lavado estomacal con carbón medicinal en agua y administrar lavantes salinos (Sulfato de sodio 20-30 g). En caso de deshidratación, administrar líquidos y sal. Si se presentan dificultades respiratorias administrar oxígeno o dar respiración artificial.
Trátese sintomáticamente.
No existe antídoto específico. Seguir las indicaciones del médico.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106 CISPPOQUIM: 0800-50847
Bayer S.A. 01-2113800



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
ACARICIDA - FUNGICIDA AGRÍCOLA
GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA (WG)

Composición:
Azufre, 800 g/kg
Aditivos, csp. 1 kg
Reg. PQUA N° 043-SENASA

Titular del Registro:
Bayer S.A.
Calle Amador Merino Reyna N. 223
Interior 802, Uto, Jardín,
San Isidro, Lima - Perú.
Telf. 2113800

Formulado por:
Quimetal Industrial S.A.
Los Yacimientos 1301, Maipo,
Santiago
Chile

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Calle Amador Merino Reyna N. 223
Interior 802, Uto, Jardín,
San Isidro, Lima - Perú.
Telf. 2113800

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO
NO INFLAMABLE

Contenido
Neto: 25 kg.

Lote N°
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

© = Marca Registrada del grupo Bayer



LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola.
Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
No permitir el ingreso de animales a las zonas tratadas.
No aplicar en época de floración del cultivo.

Sulfodin® 80% WG

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
Sulfodin 80% WG es un acaricida inorgánico recomendado para el control de araña roja en mandarina y palto, además de oidium en pimienta y vid.
El producto se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Es recomendable preparar una pre-mezcla diluyendo el producto en un volumen reducido de agua, luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS			PC* días	LMR** (ppm)
	Nombre Comun	Nombre Técnico	Kg/ha	%**	Kg/lit		
Mandarina	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	--	0.25	0.5	N.R.	N.R.
Pimienta	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	1.5-2	0.375-0.5	0.75-1	N.R.	N.R.
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	--	0.5	--	N.R.	N.R.
Palto	Araña marrón	<i>Oligonychus punicea</i>	--	--	1	N.R.	N.R.

* PC=Período de carencia (en días) **LMR=Límite máximo de residuos (en ppm)
N.R. No requiere
**% = concentración válida sólo para aplicaciones con pulverizadora manual de mochila.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Aplicaciones de acuerdo a poblaciones de plaga en el cultivo. Se recomienda realizar hasta 5 aplicaciones por campaña.

FITOTOXICIDAD:
Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados. Puede ser perjudicial si se aplica a temperaturas mayores de 30°C.
Realizar pruebas de fitocompatibilidad en los cultivos recomendados ya que cada variedad puede reaccionar de manera diferente.
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

COMPATIBILIDAD:
Puede ser empleado en mezcla con otros plaguicidas excepto con aceites de petróleo.

PERIODO DE REINGRESO:
12 horas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

