LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MÁNTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Mandelamide (Mandipropamid) / Piperidinyl thiazole isoxazoline (Oxatiapiprolin).
- En caso de Ingestión, llame al centro médico o centro de control de envenenamiento inmediatamente. No induzca al vomito. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar suavemente los ojos con agua manteniéndolos abiertos por un periodo de 15 – 20 minutos. Luego de 5 minutos, retire los lentes de contacto si es necesario y continúe su enjuague.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y botas contaminadas. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 – 20 minutos. Lave la ropa contaminada antes de su reusó, lo mismo las botas.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Nota al médico: No hay antídoto especificado en caso de ser ingerido el producto. Aplicar terapia sintomática.

TELEFONOS DE EMERGENCIA
- SAMU:106
- Syngenta Perú (1) 3484834
- CISPROQUIM: 0800-50-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite en el lugar de destinado dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos fauna y flora silvestre. "No permitir animales en el área tratada".
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

ORONDIS ULTRA

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición:
Mandipropamid..... 250 g/L
Oxatiapiprolin..... 30 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2557- SENASA

Titular del Registro:
Syngenta Crop Protectión S.A. Sucursal Perú
Av. Manuel Olguín 335 Of. 808. Urb.
Los Granados, Santiago de Surco, Lima.

Importado y Distribuido por:
TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
Calle René Descartes No 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima - Perú. Telf: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307 150981

Formulado por:
Syngenta Crop Protection, LLC
Omaha, Nebraska, 68107
Estados Unidos

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

N° de Lote:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

Contenido Neto:
1 litro

OU 02 22 REG 2 USA

syngenta®

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
- Modo de acción: Mandipropamid es translaminar y oxathiapriprolin es sistémico
- Mecanismo de acción: Madipropamid inhibe la biosíntesis de fosfolípidos, evitando la germinación de cistosporas y esporangios, e inhibiendo la formación de haustorios y el crecimiento del micelio y el oxathiapiprolin actúa en la unión a la proteína oxisterol en los oomicetos. Afecta a todas las etapas del ciclo biológico asexual del hongo, inhibiendo la formación y expansión de la lesión.
- Para la preparación, verter la cantidad de **ORONDIS ULTRA** a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádalo de último y vuelva a agitar.
- **ORONDIS ULTRA** puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

Cultivo	Enfermedades		Dosis		P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico	l/ha	cc/cil	(días)	(ppm)
Tomate	Rancha	*Phytophthora infestans*	0.5		1	*3 /**0.5
Cebolla	Mildiu	*Peronospora destructor*	0.5		7	*0.1/**0.04
Vid	Mildiu	*Plasmopara viticola*	0.7	175	10	*2/**0.7

P.C.: Periodo de Carencia **L.M.R.:** Límite Máximo de Residuos en partes por millón
* Mandipropamid / **Oxathiapiprolin

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION
- Tomate y Cebolla: Aplicar **ORONDIS ULTRA** un máximo de 2 veces por campaña (2 campañas al año), con un intervalo de 7 días [si para el control del patógeno son necesarias 3 o más aplicaciones de fungicidas, utilice **ORONDIS ULTRA** (o cualquier otro producto que contenga un ingrediente activo del grupo 49 de FRAC) en no más del 33% del número total de aplicaciones. Si se requiere hacer menos de 3 aplicaciones de fungicidas, no haga más de 1 aplicación de **ORONDIS ULTRA** (o cualquier otro producto que contenga un ingrediente activo del grupo 49 de FRAC)]
- Vid: Aplicar **ORONDIS ULTRA** un máximo de 2 veces por campaña (1 campaña al año), con un intervalo de 38 días [asegúrese de no hacer más de 2 aplicaciones de **ORONDIS ULTRA** ULTRA (o cualquier otro producto que contenga un ingrediente activo del grupo 49 de FRAC) por campaña].
- No utilice ORONDIS ULTRA para la producción de plántulas.

PERIODO DE REINGRESO
- No reingresar al área tratada antes de las 12 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD
- **ORONDIS ULTRA** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados. Se recomienda elaborar una pre-mezcla de pequeña escala para estudiar la compatibilidad de los productos.

FITOTOXICIDAD
- La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

MUESTRA PARA USO EXCLUSIVO DEL ESTADO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MÁNTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Mandelamide (Mandipropamid) / Piperidinyl thiazole isoxazoline (Oxatiapiprolin).
- En caso de Ingestión, llame al centro médico o centro de control de envenenamiento inmediatamente. No induzca al vomito. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar suavemente los ojos con agua manteniéndolos abiertos por un periodo de 15 – 20 minutos. Luego de 5 minutos, retire los lentes de contacto si es necesario y continúe su enjuague.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y botas contaminadas. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 – 20 minutos. Lave la ropa contaminada antes de su reusó, lo mismo las botas.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Nota al médico: No hay antídoto especificado en caso de ser ingerido el producto. Aplicar terapia sintomática.

TELEFONOS DE EMERGENCIA
•SAMU:106 • Syngenta Perú (1) 3484834 • CISPROQUIM: 0800-50-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite en el lugar de destinado dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos fauna y flora silvestre. "No permitir animales en el área tratada".
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

ORONDIS ULTRA

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición:
Mandipropamid..... 250 g/L
Oxatiapiprolin..... 30 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2557- SENASA

Titular del Registro:
Syngenta Crop Protectión S.A. Sucursal Perú
Av. Manuel Olguín 335 Of. 808. Urb.
Los Granados, Santiago de Surco, Lima.

Importado y Distribuido por:
TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
Calle René Descartes No 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima - Perú. Telf: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307 150981

Formulado por:
Syngenta GB Jealott's
Hill International UK
Bracknell, Berkshire,
RG42 6EY
Reino Unido

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

N° de Lote:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

Contenido Neto:
1 litro

syngenta®

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
- Modo de acción: Mandipropamid es translaminar y oxathiapriprolin es sistémico
- Mecanismo de acción: Madipropamid inhibe la biosíntesis de fosfolípidos, evitando la germinación de cistosporas y esporangios, e inhibiendo la formación de haustorios y el crecimiento del micelio y el oxathiapiprolin actúa en la unión a la proteína oxisterol en los oomicetos. Afecta a todas las etapas del ciclo biológico asexual del hongo, inhibiendo la formación y expansión de la lesión.
- Para la preparación, verter la cantidad de **ORONDIS ULTRA** a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádalo de último y vuelva a agitar.
- **ORONDIS ULTRA** puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

Cultivo	Enfermedades		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	l/ha	cc/cil		
Tomate	Rancha	*Phytophthora infestans*	0.5		1	*3/**0.5
Cebolla	Mildiu	*Peronospora destructor*	0.5		7	*0.1/**0.04
Vid	Mildiu	*Plasmopara viticola*	0.7	175	10	*2/**0.7

P.C.: Periodo de Carencia **L.M.R.:** Límite Máximo de Residuos en partes por millón
* Mandipropamid / **Oxathiapiprolin

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION
- Tomate y Cebolla: Aplicar **ORONDIS ULTRA** un máximo de 2 veces por campaña (2 campañas al año), con un intervalo de 7 días [si para el control del patógeno son necesarias 3 o más aplicaciones de fungicidas, utilice **ORONDIS ULTRA** (o cualquier otro producto que contenga un ingrediente activo del grupo 49 de FRAC) en no más del 33% del número total de aplicaciones. Si se requiere hacer menos de 3 aplicaciones de fungicidas, no haga más de 1 aplicación de **ORONDIS ULTRA** (o cualquier otro producto que contenga un ingrediente activo del grupo 49 de FRAC)]
- Vid: Aplicar **ORONDIS ULTRA** un máximo de 2 veces por campaña (1 campaña al año), con un intervalo de 38 días [asegúrese de no hacer más de 2 aplicaciones de **ORONDIS ULTRA** (o cualquier otro producto que contenga un ingrediente activo del grupo 49 de FRAC) por campaña].
- No utilice ORONDIS ULTRA para la producción de plántulas.

PERIODO DE REINGRESO
- No reingresar al área tratada antes de las 12 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD
- **ORONDIS ULTRA** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados. Se recomienda elaborar una pre-mezcla de pequeña escala para estudiar la compatibilidad de los productos.

FITOTOXICIDAD
- La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

0U 02 22 REG 2 UK

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO