"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

ORONDIS ULTRA

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición:

Mandipropamid..... 250 g/L
Oxatiapiprolin..... 30 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2557- SENASA

Titular del Registro:
Syngenta Crop Protectión S.A. Sucursal Perú. Av. Manuel Olguín 335
Of. 808. Urb. Los Granados, Santiago de Surco, Lima.

Importado y Distribuido por:

TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
Calle René Descartes No 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307 150981

Formulado por:
Syngenta Crop Protection, LLC
Omaha, Nebraska, 68107
Estados Unidos

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

N° de Lote:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

Contenido Neto:

5 litros

Los nombres de producto que contengan ® o ™,
El logo SYNGENTA y el marco CP FRAME
Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

syngenta®

0U 02 22 REG 2 USA

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MÁNTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Mandelamide (Mandipropamid) / Piperidinyl thiazole isoxazoline (Oxatiapiprolin).
- En caso de Ingestión, llame al centro médico o centro de control de envenenamiento inmediatamente. No induzca al vomito. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar suavemente los ojos con agua manteniéndolos abiertos por un periodo de 15 – 20 minutos. Luego de 5 minutos, retire los lentes de contacto si es necesario y continúe su enjuague.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y botas contaminadas. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 – 20 minutos. Lave la ropa contaminada antes de su reusó, lo mismo las botas.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Nota al médico: No hay antídoto especificado en caso de ser ingerido el producto.

Aplicar terapia sintomática.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

- SAMU:106 • Syngenta Perú (1) 3484834 • CISPROQUIM: 0800-50-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite en el lugar de destinado dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos fauna y flora silvestre. "No permitir animales en el área tratada".
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Modo de acción: Mandipropamid es translaminar y oxathiapriprolin es sistémico
- Mecanismo de acción: Madipropamid inhibe la biosíntesis de fosfolípidos, evitando la germinación de cistosporas y esporangios, e inhibiendo la formación de haustorios y el crecimiento del micelio y el oxathiapiprolin actúa en la unión a la proteína oxisterol en los oomicetos. Afecta a todas las etapas del ciclo biológico asexual del hongo, inhibiendo la formación y expansión de la lesión.
- Para la preparación, verter la cantidad de **ORONDIS ULTRA** a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádalo de último y vuelva a agitar.
- **ORONDIS ULTRA** puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas.

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

Cultivo	Enfermedades		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	l/ ha	cc/ cil		
Tomate	Rancha	*Phytophthora infestans*	0.5		1	*3/**0.5
Cebolla	Mildiu	*Peronospora destructor*	0.5		7	*0.1/**0.04
Vid	Mildiu	*Plasmopara viticola*	0.7	175	10	*2/**0.7

P.C.: Período de Carencia
L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón
*Mandipropamid / **Oxathiapriprolin

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

- Tomate y Cebolla: Aplicar **ORONDIS ULTRA** un máximo de 2 veces por campaña (2 campañas al año), con un intervalo de 7 días [si para el control del patógeno son necesarias 3 o más aplicaciones de fungicidas, utilice **ORONDIS ULTRA** (o cualquier otro producto que contenga un ingrediente activo del grupo 49 de FRAC) en no más del 33% del número total de aplicaciones. Si se requiere hacer menos de 3 aplicaciones de fungicidas, no haga más de 1 aplicación de **ORONDIS ULTRA** (o cualquier otro producto que contenga un ingrediente activo del grupo 49 de FRAC)]
- Vid: Aplicar **ORONDIS ULTRA** un máximo de 2 veces por campaña (1 campaña al año), con un intervalo de 38 días [asegúrese de no hacer más de 2 aplicaciones de ORONDIS ULTRA (o cualquier otro producto que contenga un ingrediente activo del grupo 49 de FRAC) por campaña].
- No utilice **ORONDIS ULTRA** para la producción de plántulas.

PERIODO DE REINGRESO

- No reingresar al área tratada antes de las 12 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD

- **ORONDIS ULTRA** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados. Se recomienda elaborar una pre-mezcla de pequeña escala para estudiar la compatibilidad de los productos.

FITOTOXICIDAD

- La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico quimicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ESTUDIO PARA USO EXCLUSIVO DEL REGISTRO

0U 02 22 REG 2 USA

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

ORONDIS ULTRA

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición:

Mandipropamid..... 250 g/L
Oxatiapiprolin..... 30 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2557- SENASA

Titular del Registro:
Syngenta Crop Protectión S.A. Sucursal Perú. Av. Manuel Olguín 335
Of. 808. Urb. Los Granados, Santiago de Surco, Lima.

Importado y Distribuido por:

TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
Calle René Descartes No 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307 150981

Formulado por:
Syngenta GB Jealott's Hill
International UK
Bracknell, Berkshire, RG42 6EY
Reino Unido

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

N° de Lote:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

Contenido Neto:

5 litros

Los nombres de producto que contengan ® o ™,
El logo SYNGENTA y el marco CP FRAME
Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

OU 02 22 REG 2 UK

syngenta®

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MÁNTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

• Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
• Causa irritación moderada a los ojos.
• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
• Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
• Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
• No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
• Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
• Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
• Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
• Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

• Grupo químico: Mandelamide (Mandipropamid) / Piperidinyl thiazole isoxazoline (Oxatiapiprolin).
• En caso de Ingestión, llame al centro médico o centro de control de envenenamiento inmediatamente. No induzca al vomito. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.
• En caso de contacto con los ojos: Enjuagar suavemente los ojos con agua manteniéndolos abiertos por un periodo de 15 – 20 minutos. Luego de 5 minutos, retire los lentes de contacto si es necesario y continúe su enjuague.
• En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y botas contaminadas. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 – 20 minutos. Lave la ropa contaminada antes de su reusó, lo mismo las botas.
• En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
• Nota al médico: No hay antídoto especificado en caso de ser ingerido el producto.
Aplicar terapia sintomática.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

• SAMU:106 • Syngenta Perú (1) 3484834 • CISPROQUIM: 0800-50-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

• Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite en el lugar de destinado dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
• Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
• Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

• Peligroso para organismos acuáticos.
• No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
• No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
• Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
• Peligroso para los animales domésticos fauna y flora silvestre. "No permitir animales en el área tratada".
• El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
• El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
• En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

• Modo de acción: Mandipropamid es translaminar y oxathiapriprolin es sistémico
• Mecanismo de acción: Madipropamid inhibe la biosíntesis de fosfolípidos, evitando la germinación de cistosporas y esporangios, e inhibiendo la formación de haustorios y el crecimiento del micelio y el oxathiapiprolin actúa en la unión a la proteína oxisterol en los oomicetos. Afecta a todas las etapas del ciclo biológico asexual del hongo, inhibiendo la formación y expansión de la lesión.
• Para la preparación, verter la cantidad de **ORONDIS ULTRA** a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añadalo de último y vuelva a agitar.
• **ORONDIS ULTRA** puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas.

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

Cultivo	Enfermedades		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	l/ ha	cc/ cil		
Tomate	Rancha	*Phytophthora infestans*	0.5		1	*3/**0.5
Cebolla	Mildiu	*Peronospora destructor*	0.5		7	*0.1/**0.04
Vid	Mildiu	*Plasmopara viticola*	0.7	175	10	*2/**0.7

P.C.: Periodo de Carencia
L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón
* Mandipropamid / **Oxathiapiprolin

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

• Tomate y Cebolla: Aplicar **ORONDIS ULTRA** un máximo de 2 veces por campaña (2 campañas al año), con un intervalo de 7 días [si para el control del patógeno son necesarias 3 o más aplicaciones de fungicidas, utilice **ORONDIS ULTRA** (o cualquier otro producto que contenga un ingrediente activo del grupo 49 de FRAC) en no más del 33% del número total de aplicaciones. Si se requiere hacer menos de 3 aplicaciones de fungicidas, no haga más de 1 aplicación de **ORONDIS ULTRA** (o cualquier otro producto que contenga un ingrediente activo del grupo 49 de FRAC)]
• Vid: Aplicar **ORONDIS ULTRA** un máximo de 2 veces por campaña (1 campaña al año), con un intervalo de 38 días [asegúrese de no hacer más de 2 aplicaciones de ORONDIS ULTRA (o cualquier otro producto que contenga un ingrediente activo del grupo 49 de FRAC) por campaña].
• No utilice **ORONDIS ULTRA** para la producción de plántulas.

PERIODO DE REINGRESO

• No reingresar al área tratada antes de las 12 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD

• **ORONDIS ULTRA** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados. Se recomienda elaborar una pre-mezcla de pequeña escala para estudiar la compatibilidad de los productos.

FITOTOXICIDAD

• La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

OU 02 22 REG 2 UK

EJEMPLAR PARA USO EXCLUSIVO DEL FISCA