

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

ORONDIS ULTRA

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición:

Mandipropamid..... 250 g/L
Oxatiapiprolin..... 30 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2557- SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protección S.A. Sucursal Perú. Av. Manuel Olgún 335
Of. 808. Urb. Los Granados, Santiago de Surco, Lima.

Importado y Distribuido por:



TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.

Calle René Descartes No 311 . Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf: 612-6565, Fax: 348-1020. R.U.C N° 20307 150981

Formulado por:

Syngenta Crop Protection, LLC
Omaha, Nebraska, 68107
Estados Unidos

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Contenido Neto:

10 litros

Los nombres de producto que contengan ® o ™,
El logo SYNGENTA y el marco CP FRAME
Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta



00 02 22 REG 2 USA

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MÁNTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Mandelamide (Mandipropamid) / Piperidinyl thiazole isoxazoline (Oxathiapropilín).
- En caso de Ingestión, llame al centro médico o centro de control de envenenamiento inmediatamente. No induzca al vómito. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar suavemente los ojos con agua manteniéndolos abiertos por un periodo de 15 – 20 minutos. Luego de 5 minutos, retire los lentes de contacto si es necesario y continúe su enjuague.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y botas contaminadas. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 – 20 minutos. Lave la ropa contaminada antes de su reuso, lo mismo las botas.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Nota al médico: No hay antídoto especificado en caso de ser ingerido el producto. Aplicar terapia sintomática.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

- SAMU:106 • Syngenta Perú (1) 3484834 • CISPROQUIM: 0800-50-847

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS
Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos fauna y flora silvestre. "No permitir animales en el área tratada".
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Modo de acción: Mandipropamid es translinar y oxathiapropilín es sistémico
- Mecanismo de acción: Mandipropamid inhibe la biosíntesis de fosfolípidos, evitando la germinación de cistosporas y esporangios, e inhibiendo la formación de haustorios y el crecimiento del micelio y el oxathiapropilín actúa en la unión a la proteína oxisterol en los oomicetos. Afecta a todas las etapas del ciclo biológico asexual del hongo, inhibiendo la formación y expansión de la lesión.
- Para la preparación, verter la cantidad de **ORONDIS ULTRA** a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádale de último y vuelva a agitar.
- **ORONDIS ULTRA** puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

Cultivo	Enfermedades		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	l/ha	cc/cil		
Tomate	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.5		1	*3/**0.5
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	0.5		7	*0.1/**0.04
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	0.7	175	10	*2/**0.7

P.C.: Periodo de Carencia
L.M.R.: Limite Máximo de Residuos en partes por millón
* Mandipropamid / ** Oxathiapropilín

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

- Tomate y Cebolla: Aplicar **ORONDIS ULTRA** un máximo de 2 veces por campaña (2 campañas al año), con un intervalo de 7 días [si para el control del patógeno son necesarias 3 o más aplicaciones de fungicidas, utilice **ORONDIS ULTRA** (o cualquier otro producto que contenga un ingrediente activo del grupo 49 de FRAC) en no más del 33% del número total de aplicaciones. Si se requiere hacer menos de 3 aplicaciones de fungicidas, no haga más de 1 aplicación de **ORONDIS ULTRA** (o cualquier otro producto que contenga un ingrediente activo del grupo 49 de FRAC)]
- Vid: Aplicar **ORONDIS ULTRA** un máximo de 2 veces por campaña (1 campaña al año), con un intervalo de 38 días [asegúrese de no hacer más de 2 aplicaciones de **ORONDIS ULTRA** (o cualquier otro producto que contenga un ingrediente activo del grupo 49 de FRAC) por campaña].
- No utilice **ORONDIS ULTRA** para la producción de plántulas.

PERIODO DE REINGRESO

- No reingresar al área tratada antes de las 12 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD

- **ORONDIS ULTRA** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados. Se recomienda elaborar una pre-mezcla de pequeña escala para estudiar la compatibilidad de los productos.

FITOTOXICIDAD

- La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

OU 02 22 REG 2 USA



"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

ORONDIS ULTRA

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición:

Mandipropamid.....	250 g/L
Oxatiapiprolin.....	30 g/L
Aditivos	c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2557- SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protección S.A. Sucursal Perú. Av. Manuel Olgúin 335
Of. 808. Urb. Los Granados, Santiago de Surco, Lima.

Importado y Distribuido por:



TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.

Calle René Descartes No 311 . Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf: 612-6565, Fax: 348-1020. R.U.C N° 20307 150981

Formulado por:

Syngenta GB Jealott's Hill International UK
Bracknell, Berkshire, RG42 6EY
Reino Unido

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Contenido Neto:

10 litros

Los nombres de producto que contengan ® o ™,
El logo SYNGENTA y el marco CP FRAME
Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta



syngenta®

DU 02.22 REG 2 UK

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MÁNTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Mandelamide (Mandipropamid) / Piperidinyl thiazole isoxazoline (Oxathiapropilín).
- En caso de Ingestión, llame al centro médico o centro de control de envenenamiento inmediatamente. No induzca al vómito. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar suavemente los ojos con agua manteniéndolos abiertos por un periodo de 15 – 20 minutos. Luego de 5 minutos, retire los lentes de contacto si es necesario y continúe su enjuague.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y botas contaminadas. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 – 20 minutos. Lave la ropa contaminada antes de su reuso, lo mismo las botas.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Nota al médico: No hay antídoto especificado en caso de ser ingerido el producto. Aplicar terapia sintomática.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

- SAMU:106 • Syngenta Perú (1) 3484834 • CISPROQUIM: 0800-50-847

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS
Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos fauna y flora silvestre. "No permitir animales en el área tratada".
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Modo de acción: Mandipropamid es translinar y oxathiapropilín es sistémico
 - Mecanismo de acción: Mandipropamid inhibe la biosíntesis de fosfolípidos, evitando la germinación de cistosporas y esporangios, e inhibiendo la formación de haustorios y el crecimiento del micelio y el oxathiapropilín actúa en la unión a la proteína oxisterol en los oomicetos. Afecta a todas las etapas del ciclo biológico asexual del hongo, inhibiendo la formación y expansión de la lesión.
 - Para la preparación, verter la cantidad de **ORONDIS ULTRA** a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádale de último y vuelva a agitar.
 - **ORONDIS ULTRA** puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas
- "Consulte con un Ingeniero Agrónomo"**

Cultivo	Enfermedades		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	l/ ha	cc/ cil		
Tomate	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.5		1	*3/**0.5
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	0.5		7	*0.1/**0.04
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	0.7	175	10	*2/**0.7

P.C.: Periodo de Carencia
L.M.R.: Limite Máximo de Residuos en partes por millón
* Mandipropamid / ** Oxathiapropilín

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

- Tomate y Cebolla: Aplicar **ORONDIS ULTRA** un máximo de 2 veces por campaña (2 campañas al año), con un intervalo de 7 días [si para el control del patógeno son necesarias 3 o más aplicaciones de fungicidas, utilice **ORONDIS ULTRA** (o cualquier otro producto que contenga un ingrediente activo del grupo 49 de FRAC) en no más del 33% del número total de aplicaciones. Si se requiere hacer menos de 3 aplicaciones de fungicidas, no haga más de 1 aplicación de **ORONDIS ULTRA** (o cualquier otro producto que contenga un ingrediente activo del grupo 49 de FRAC)]
- Vid: Aplicar **ORONDIS ULTRA** un máximo de 2 veces por campaña (1 campaña al año), con un intervalo de 38 días [asegúrese de no hacer más de 2 aplicaciones de **ORONDIS ULTRA** (o cualquier otro producto que contenga un ingrediente activo del grupo 49 de FRAC) por campaña].
- No utilice **ORONDIS ULTRA** para la producción de plántulas.

PERIODO DE REINGRESO

- No reingresar al área tratada antes de las 12 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD

- **ORONDIS ULTRA** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados. Se recomienda elaborar una pre-mezcla de pequeña escala para estudiar la compatibilidad de los productos.

FITOTOXICIDAD

- La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

OU 02 22 REG 2 UK

