

22 cm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# BLINDAJE<sup>®</sup> 25% WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

**COMPOSICIÓN:**

Buprofezin..... 250 g/Kg  
Aditivos.....c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 2361 - SENASA



**Titular de Registro:**  
**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C**  
Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B  
Santiago de Surco, Lima, Perú  
Teléfono: (01) 499-7831

**Importado y distribuido por:**  
**PERÚ PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A.C.**

Av. Nicolás Arriola 2374  
San Luis, Lima - Perú  
Teléfono: (01) 547-0638

**Formulado por:**  
**YIXING XINGNONG CHEMICAL PRODUCTS CO. LTD**  
Wanshi Town Yixing City  
Jiangsu Province China 214217 China

Contenido Neto: 500 g  
N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

22 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es DAÑINO, no ingerir. Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese la ropa y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Triadiazinas.
- En caso de ingestión: llevar al paciente inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta. No provoque el vómito si la persona está inconsciente.
  - En caso de inhalación, retirar al paciente a un lugar fresco y aplicar oxígeno o respiración artificial, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta.
  - En caso de contacto con los ojos o alguna parte del cuerpo, lávelos inmediatamente con agua y jabón durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
  - En caso de contacto con la piel remover la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada.
  - En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
  - Antídoto: No existe. Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; INAP: (01) 499-7831****CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entreguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos o envases vacíos.

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales ó en suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto de ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**BLINDAJE 25% WP** es un insecticida de contacto y estomacal, no se transloca en la planta. Su ingrediente activo inhibe hormonalmente el crecimiento del insecto, interfiriendo con la síntesis de quitina y resultando en un exoesqueleto débil y blando, así como apéndices y órganos sexuales deformados. Se aplica en aspersión previa mezcla en agua. Se recomienda llenar el cilindro hasta la mitad y agregar la dosis recomendada de **BLINDAJE 25% WP**; agitar continuamente y completar el resto con agua. Aplicar en aspersión con un equipo en perfecto estado y debidamente calibrado.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Tomate: realizar como máximo 1 aplicación/campaña, considerando como máximo 2 campañas/año.

Palto: la dosis máxima de aplicación es 1Kg/ha; realizar como máximo 2 aplicaciones/campaña, considerando como máximo 1 campaña/año.

Vid: realizar como máximo 2 aplicaciones (cada 14 días)/campaña, considerando como máximo 1 campaña/año.

Mango: realizar como máximo 1 aplicación/campaña, considerando como máximo 1 campaña/año. Aplicar el producto previa evaluación de la plaga.

**PERIODO DE REINGRESO**

24 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/200L	Kg/ha		
Mango	Queresa del mango	<i>Milviscutulus mangiferae</i>	0.2	0.4	14	0.1
Palto	Queresa	<i>Fiorinia fioriniae</i>	0.2	-	21	0.3
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.17	-	1	1
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	0.2 - 0.25	1 - 1.25	7	1

P.C.: Período de Carencia. L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (partes por millón).



32 cm

32 cm