"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de Cuidado. No ingerir. Causa irritación moderada a los ojos.
- Este producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Diamidas (Cyantraniliprole)/ Neonicotinoides (Thiamethoxam)
- En caso de ingestión, llame al centro médico. No induzca al vomito. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar suavemente los ojos con agua manteniéndolos abiertos por un periodo de 15 – 20 minutos. Luego de 5 minutos, retire los lentes de contacto si es necesario y continúe su enjuague.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y botas contaminadas. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 – 20 minutos. Busque atención médica. Lave la ropa contaminada antes de su reusó, lo mismo las botas.
- Nota al médico: No hay antídoto específicado. Aplicar terapia sintomática.

TELEFONOS DE EMERGENCIA: SAMU 106 • CISPROQUIM: 0800-050-847 • Syngenta Perú: (01) 4345600

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite en el lugar de destinado dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

SEGURIDAD – RESPONSABILIDAD – TRIPLE LAVADO – AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas. No aplicar en presencia de polinizadores. No aplicar en época de floración del cultivo o si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- No permita que la deriva de la aplicación alcance áreas de vegetación natural o cultivos cercanos en floración.
- Respetar una franja de seguridad de 5 metros con relación a áreas de vegetación natural.
- Peligroso para organismos acuáticos. Evite que el producto alcance cualquier fuente de agua (ya sea agua corriente o estancada) o el suelo.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- No lave o enjuague el equipo de aplicación cerca a fuentes de agua o áreas sin aplicar; vierta el enjuague sobre áreas ya aplicadas.
- Evite la contaminación de fuentes de agua superficial por deriva o escorrentía. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Al momento de hacer la aplicación, evite que el producto caiga al borde de las fuentes de agua superficial cercanas al campo, teniendo en cuenta una zona en la que no se realice la aplicación y dejando una franja de seguridad para la escorrentía.
- Respetar una franja de seguridad de al menos 5 metros con relación a cuerpos de agua.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en un sitio destinado por las autoridades ocales para este fin y evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

MINECTO DUO 40 WG

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

Gránulos Dispersables (WG)

Composición

Cyantraniliprole	200 g/kg
Thiamethoxam	200 g/kg
Aditivos c.s.p.	1 kg

PQUA N° 2558 - SENASA

Titular del Registro:
Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú
Av. Manuel Olguin 335, Of 808,
Urb. Los Granados – Santiago de Surco

Importado y Distribuido por:
FARMAGRO
Av. Principal 2. Mz C5 (Lote 3B, 4 y 5)
Z.I Huachipa Este
San Antonio – Huarochirí, Lima
Central: (01) 6141500

Formulado por:
Gowan Milling, LLC
Estados Unidos

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Fecha de vencimiento:

Contenido neto: 600 g

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

Los nombres de producto que contengan ® o TM y el logo de SYNGENTA son marcas comerciales de una compañía del Grupo Syngenta

MD 07 22 41082 13

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Modo y mecanismo de acción: Cyantraniliprole pertenece al grupo químico diamides y ha sido asignado al Grupo 28 de la clasificación por modo de acción de los insecticidas de IRAC. Es ligeramente sistémico, actúa por contacto e ingestión. Tiene la capacidad de imitar a la rianodina y activar los receptores de rianodina de los insectos. Thiamethoxam pertenece a los neonicotinoides y al Grupo 4A de IRAC. Tiene acción sistémica. En el insecto plaga muestra una rápida acción estomacal y de contacto. Actúa interfiriendo con el receptor nicotínico de acetilcolina del sistema nervioso de los insectos.

Modo de empleo: Aplicar con equipo terrestre (manual, atomizadora, estacionaria o tractorizado) que cuente con boquillas adecuadas. Se debe calibrar el equipo y el ritmo de aplicación.

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

Cultivo	Plagas	Dosis		P.C.	LMR
		g/ha	g/cil	(días)	(ppm)
Tomate	Caracha *(Prodiplosis longifila)*	700		0	*1.0/**0.2
Pimiento				20	*1.5/**0.7
Papa	Gorgojo de los Andes *(Premnotrypes suturicallus)*	300[1]	200	30	*0.05/**0.25
	Mosca minadora *(Liriomyza huidobrensis)*	400	200[2]		
Arroz	Sogata *(Tagosodes orizicolus)*	200	200	15	*0.01/**6.0

PC: Período de Carencia **LMR:** Límite Máximo de Residuos *Cyantraniliprole / **Thiamethoxam

Nota: Para cultivos de exportación dar aplicación a los requerimientos exigibles según el país de destino.

Frecuencia y época de aplicación: Tomate y Pimiento: Hacer 1 aplicación por campaña (2 campañas/año) en drench o por sistema de riego, 7 días después del trasplante. Papa: Hacer 1 aplicación por campaña / año. Para Gorgojo, aplicar con 80-100% de emergencia y un gasto de agua de 300 l/ha. Para Mosca minadora, aplicar con un gasto de agua de 400 l/ha. Arroz: Hacer 1 aplicación foliar por campaña (2 campañas/año) con la aparición de los primeros individuos. Evitar la aplicación al menos 10 días antes de la floración en arroz y papa.

Manejo de resistencia: Para evitar o retrasar el desarrollo de resistencia tenga en cuenta lo siguiente: Usar **Minecto® Duo** u otros insecticidas del Grupo 28 con un enfoque de "ventana" para evitar la exposición de generaciones sucesivas de la plaga al mismo modo de acción. Una "ventana" se define como el período de actividad residual proporcionado por aplicaciones únicas o secuenciales de productos con el mismo modo de acción y no debe exceder la duración de una generación de la plaga. El período en que las plagas se controlen con insecticidas del Grupo 28 no debe exceder el 50 % del cultivo. Después de una "ventana" del Grupo 28, cambie a una ventana con productos efectivos con un modo de acción diferente. Esta "ventana" fuera del grupo 28 debe aproximarse a la duración de una generación de la plaga. Evite usar dosis inferiores a las indicadas en la etiqueta cuando se aplique solo o en mezclas de tanque. Enfóquese en las etapas de vida más susceptibles de los insectos, siempre que sea posible.

Periodo de reentrada (reingreso): 12 horas después de la aplicación

Compatibilidad: No se conocen incompatibilidades; sin embargo, antes de mezclarlo con otro producto se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala.

Fitotoxicidad: No se ha observado. Sin embargo, debido al gran número de híbridos y variedades existentes, se recomienda hacer ensayos a pequeña escala para observar la fitocompatibilidad. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos

Responsabilidad Civil: "El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO