

KRIPTON

15 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Eamectin benzoate 50 g/kg
Lambda-cyhalothrin 100 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Registro Nacional PQUA N° 2576 - SENASA

Titular del Registro:
PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfono: + 51 -1 - 222-2795



Formulado por:
NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

Importado y Distribuido por:
SANIVÉG PERU S.A.C.
Av. San Jenaro 235 - Urb. Industrial Puente Piedra -
Puente Piedra - Lima - Perú.
Teléfono: + 51 - 1 - 016371269
Celular: + 51 - 959292596



Número de lote:
Fecha de Fabricación:
Fecha de Vencimiento:

CONTENIDO NETO: 100 G.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

“LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“Este producto es **DAÑINO**. No ingerir”
“Puede ser letal si es inhalado. No respire (polvo, vapor o aspersión)”
“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación”
“En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente, o lleve al paciente al medico y muestrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta”
“Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin”
“Tóxico para abejas y artrópodos benéficos”
“Peligroso para organismos acuáticos”

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800-13040 / ESSALUD: 0801-10200

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis kg/200L	P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico			
Esparrago (<i>Asparagus officinalis</i>)	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.1	28	*0.01 **0.02
Pimiento (<i>Capsicum annum</i>)	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.1	5	*0.02 **0.01

P.C.: Periodo de carencia (días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm)

*Eamectin benzoate **Lambda-cyhalothrin

Se recomienda 2 aplicaciones por campaña de acuerdo a la incidencia de la plaga. Aplicar cuando la plaga este presente o cuando se dé las condiciones favorables para la rápida reproducción

