

KRIPTON

15 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoate	50 g/kg
Lambda-cyhalothrin	100 g/kg
Aditivos	c.s.p. 1 kg

Registro Nacional PQUA N°

SENASA

Titular del Registro:

PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.

Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.

Teléfono:00 51 -1 - 222-2795



Formulado por:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.

Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,

Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.

Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

Importado por:

PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.

Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.

Teléfono:00 51 -1 - 222-2795

Número de lote:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

CONTENIDO NETO: 200 g.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

“LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“Este producto es DAÑINO. No ingerir”

“Puede ser letal si es inhalado. No respire (polvo, vapor o aspersión)”

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación”

“En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente, o lleve al paciente al medico y muestrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta”

“Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin”

“Tóxico para abejas y artrópodos benéficos”

“Peligroso para organismos acuáticos”

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800-13040 / ESSALUD: 0801-10200

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis kg/200L	P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico			
Esparago (<i>Asparagus officinalis</i>)	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.1	28	*0.01 **0.02
Pimiento (<i>Capsicum annum</i>)	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.1	5	*0.02 **0.01

P.C.: Periodo de carencia (días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm)

* Emamectin benzoate **Lambda-cyhalothrin

Se recomienda 2 aplicaciones por campaña de acuerdo a la incidencia de la plaga. Aplicar cuando la plaga este presente o cuando se dé las condiciones favorables para la rápida reproducción

