“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

KRIPTON
15 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Emamectin benzoate ..... 50 g/Kg
Lambda-cyhalothrin ..... 100 g/Kg
Additivos ..... c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 2576 - SENASA

Titular de Registro:
NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.
Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505, Miraflores, Lima, Peru
Teléfono:+51-1-222-2795

Formulador:
NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: +86-574-87301088

Importador y Distribuidor:
NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.
Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505, Miraflores, Lima, Peru
Teléfono:+51-1-222-2795

N° de Lote:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

Contenido Neto: 200 G

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“Este producto es DAÑINO. No ingerir”
“Puede ser letal si es inhalado. No respire (polvo, vapor o aspersión)”
“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación”
“En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente, o lleve al paciente al medico y muestrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta”
“Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin”
“Tóxico para abejas y artrópodos benéficos”
“Peligroso para organismos acuáticos”

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.:+ 51-1-222-2795

Consulte con un ingeniero agrónomo

Cultivo	Plaga		Dosis Kg/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Esparrago (*Asparagus officinalis*)	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	0.1	28	0.01* 0.02**
Pimiento (*Capsicum annuum*)	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	0.1	5	0.02* 0.01**

P.C.: Periodo de carencia
* Emamectin benzoate

L.M.R.: Límite máximo de residuos
**Lambda-cyhalothrin

Se recomienda 2 aplicaciones por campaña de acuerdo a la incidencia de la plaga. Aplicar cuando la plaga este presente o cuando se dé las condiciones favorables para la rápida reproducción