

# KRIPTON

## 15 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

POLVO MOJABLE - WP

**COMPOSICIÓN:**

Emamectin benzoate ..... 50 g/kg  
 Lambda-cyhalothrin ..... 100 g/kg  
 Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

**Registro Nacional PQUA N° 2576 - SENASA**

**Titular del Registro:**

**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**  
 Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.  
 Teléfono: + 51 -1 - 222-2795



**Formulado por:**

**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**  
 Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,  
 Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.  
 Teléfono: + 86 - 574 - 87301088

**Importado y Distribuido por:**

**AGROPECUARIA CHIMÚ S.R.L.**  
 Av. César Vallejo N° 220 - Urb. Palermo -  
 Trujillo - La Libertad - Perú  
 Teléfono: + 51 - 44 - 203962



**Número de lote:**

**Fecha de Fabricación:**  
**Fecha de Vencimiento:**

**CONTENIDO NETO: 500 G**

NO INFLAMABLE



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

**“LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**  
**“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

“Este producto es DAÑINO. No ingerir”  
 “Puede ser letal si es inhalado. No respire (polvo, vapor o aspersión)”  
 “Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación”  
 “En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente, o lleve al paciente al medico y muestrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta”  
 “Después de usar el contenido, destruya el envase y dépositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin”  
 “Tóxico para abejas y artrópodos benéficos”  
 “Peligroso para organismos acuáticos”

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
**CICOTOX: 0800-13040 / ESSALUD: 0801-10200**

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

Cultivo	Plaga		Dosis kg/200L	P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico			
Esparrago ( <i>Asparagus officinalis</i> )	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.1	28	*0.01 **0.02
Pimiento ( <i>Capsicum annum</i> )	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.1	5	*0.02 **0.01

P.C.: Periodo de carencia (días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm)

\*Emamectin benzoate \*\*Lambda-cyhalothrin

Se recomienda 2 aplicaciones por campaña de acuerdo a la incidencia de la plaga. Aplicar cuando la plaga este presente o cuando se dé las condiciones favorables para la rápida reproducción

