

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# KRIPTON

## 15 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

**Composición:**

Eamectin benzoate ..... 50 g/Kg  
Lambda-cyhalothrin ..... 100 g/Kg  
Additivos ..... c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 2576 - SENASA

**Titular de Registro:**

NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.

Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505, Miraflores, Lima, Peru  
Teléfono:+51-1-222-2795



**Formulador:**

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.

Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.  
Teléfono: +86-574-87301088

**Importador y Distribuidor:**

AGROPECUARIA CHIMU S.R.L.

Av. César Vallejo N° 220 – Urb. Palermo - Trujillo- La Libertad- Perú  
Teléfono: + 51 - 44 - 203962



N° de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

Contenido Neto: 250 G

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA  
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS  
NIÑOS”

“Este producto es DAÑINO. No ingerir”

“Puede ser letal si es inhalado. No respire (polvo, vapor o aspersión)”

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área  
tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación”

“En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente, o lleve al paciente al  
medico y muestrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta”

“Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios  
destinados por las autoridades locales para este fin”

“Tóxico para abejas y artrópodos benéficos”

“Peligroso para organismos acuáticos”

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

SAMU: 106

NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.:+ 51-1-222-2795

**Consulte con un ingeniero agrónomo**

| Cultivo                                       | Plaga            |                              | Dosis<br>Kg/200L | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm)    |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------|-----------------|
|                                               | Nombre Común     | Nombre Científico            |                  |              |                 |
| Esparrago<br>( <i>Asparagus officinalis</i> ) | Gusano cogollero | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.1              | 28           | 0.01*<br>0.02** |
| Pimiento<br>( <i>Capsicum annuum</i> )        | Gusano cogollero | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.1              | 5            | 0.02*<br>0.01** |

**P.C.:** Periodo de carencia

\*Eamectin benzoate

**L.M.R.:** Límite máximo de residuos

\*\*Lambda-cyhalothrin

Se recomienda 2 aplicaciones por campaña de acuerdo a la incidencia de la plaga.  
Aplicar cuando la plaga este presente o cuando se dé las condiciones favorables para la  
rápida reproducción

