

BLAZER[®]

PLUS

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN

Propineb.....700 g/Kg
Aditivosc.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° - SENASA

**TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO
Y DISTRIBUIDO POR:**

POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto 304 - Urb Sta Patricia II Etapa

La Molina, Lima, Perú

Teléfono: (01) 348-1018 / 349-9609

FORMULADO POR:

POINT INTERNATIONAL LTD.

42 St. Margarets Grove

Twickenham TW1 1JG

United Kingdom

Contenido

Neto: 50Kg

Número de Lote :

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

“LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Para su uso se debe tener en cuenta las siguientes medidas generales de precaución para el manejo de plaguicidas:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Ditiocarbamatos
- En caso de inhalación, llevar al paciente al aire fresco inmediatamente. Controlar la respiración, si se detuviese utilizar medios mecánicos para dar respiración y suministrar oxígeno. Consulte con el médico.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental, no induzca al vómito si el paciente está convulsionando o si se encuentra inconsciente. Consiga ayuda médica.
- No hay antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

Teléfonos de Emergencia:

CICOTOX: (01) 328-7700

ESSALUD: (01) 411-8000 (opción 4)

POINT ANDINA S.A.: (01) 348-1018 / 349-9609

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, flora, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoja el producto y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BLAZER PLUS es un fungicida de contacto de acción preventiva. Para el caso de *Stemphylium vesicarium* también actúa como curativo para inicios de la infestación. Para su aplicación, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego aplicar el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

BLAZER PLUS puede aplicarse en cualquier etapa fenológica del cultivo, con un máximo de 2 aplicaciones por campaña. Para *Stemphylium vesicarium* en espárrago realizar la segunda aplicación después de 15 días, si se observa una mayor incidencia del patógeno.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

BLAZER PLUS es compatible con la gran mayoría de los pesticidas de uso agrícola, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

BLAZER PLUS no es fitotóxico siempre que se use de acuerdo a las recomendaciones dadas en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en las etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	PC días	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	g/200L		
Espárrago	“Roya”	<i>Puccinia asparagi</i>	500	30	0.5
	“Mancha púrpura”	<i>Stemphylium vesicarium</i>	500-1000	30	0.5
Papa	“Rancha”	<i>Phytophthora infestans</i>	500	7	0.05

LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón

PC: Periodo de carencia

