

# BLAZER<sup>®</sup>

## PLUS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

### COMPOSICIÓN

Propineb.....700 g/Kg  
Aditivos .....c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 2582 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.



Av. Javier Prado Este N° 6726 Int. 301-A  
Urb. Santa Patricia II Etapa  
La Molina, Lima, Perú  
Teléfono: (01) 499-7831

FORMULADO POR: POINT INTERNATIONAL LTD.

42 St. Margarets Grove  
Twickenham TW1 1JG  
United Kingdom

IMPORTADO

Y DISTRIBUIDO POR: INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.

Av. Javier Prado Este N° 6726 Int. 301-A  
Urb. Santa Patricia II Etapa  
La Molina, Lima, Perú  
Teléfono: (01) 499-7831

Contenido  
Neto: 40Kg

Número de Lote :  
Fecha de Formulación :  
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

# “LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

## “MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Para su uso se debe tener en cuenta las siguientes medidas generales de precaución para el manejo de plaguicidas:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Ditiocarbamatos
- En caso de inhalación, llevar al paciente al aire fresco inmediatamente. Controlar la respiración, si se detuviese utilizar medios mecánicos para dar respiración y suministrar oxígeno. Consulte con el médico.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental, no induzca al vómito si el paciente está convulsionando o si se encuentra inconsciente. Consiga ayuda médica.
- No hay antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

#### Teléfonos de Emergencia:

CICOTOX: (01) 328-7700

ESSALUD: (01) 411-8000 (opción 4)

INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS: (01) 499-7831

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, flora, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoja el producto y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**BLAZER PLUS** es un fungicida de contacto de acción preventiva. Para el caso de *Stemphylium vesicarium* también actúa como curativo para inicios de la infestación. Para su aplicación, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego aplicar el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

**BLAZER PLUS** puede aplicarse en cualquier etapa fenológica del cultivo, con un máximo de 2 aplicaciones por campaña. Para *Stemphylium vesicarium* en espárrago realizar la segunda aplicación después de 15 días, si se observa una mayor incidencia del patógeno.

### PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

### COMPATIBILIDAD:

**BLAZER PLUS** es compatible con la gran mayoría de los pesticidas de uso agrícola, excepto con los de reacción alcalina.

### FITOTOXICIDAD:

**BLAZER PLUS** no es fitotóxico siempre que se use de acuerdo a las recomendaciones dadas en la presente etiqueta.

### RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en las etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”

## “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO   | PLAGAS           |                               | DOSIS    | PC días | LMR (ppm) |
|-----------|------------------|-------------------------------|----------|---------|-----------|
|           | Nombre común     | Nombre científico             | g/200L   |         |           |
| Espárrago | “Roya”           | <i>Puccinia asparagi</i>      | 500      | 30      | 0.5       |
|           | “Mancha púrpura” | <i>Stemphylium vesicarium</i> | 500-1000 | 30      | 0.5       |
| Papa      | “Rancha”         | <i>Phytophthora infestans</i> | 500      | 7       | 0.05      |

LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón

PC: Periodo de carencia

