

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO. No ingerir, evitar contacto con la piel y la ropa.
- Causa daño temporal a los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa usada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DUELO es un insecticida del grupo de los piretroides que actúa a nivel del sistema nervioso del insecto, a través de los canales de sodio, produciendo sobreexcitación nerviosa y luego la muerte.

DUELO se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Se requiere que el suelo esté en capacidad de campo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO   | PLAGA               |                              | DOSIS  |      | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|---------------------|------------------------------|--------|------|--------------|--------------|
|           | NOMBRE COMÚN        | NOMBRE CIENTÍFICO            | L/200L | L/ha |              |              |
| Alcachofa | Gusano perforador   | <i>Heliothis virescens</i>   | 0.25   | 0.50 | 1            | 5            |
| Cebolla   | Trips de la cebolla | <i>Thrips tabaci</i>         | 0.15   | 0.30 | 1            | 0.1          |
| Pimiento  | Gusano cogollero    | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.25   | 0.50 | 3            | 0.5          |

PC: Periodo de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos expresado en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar previa evaluación de la plaga.  
Como máximo aplicar 1 sola vez en alcachofa y pimiento, 2 veces en cebolla.  
La dosis máxima por hectárea se indica en el cuadro de usos.  
En caso se requiera una nueva aplicación, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción a fin de evitar resistencia.  
No aplicar en floración.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico usado a la dosis recomendada en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

