

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupos químicos: Aryloxyalkanoic acid; giberelinas.

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Teléfonos de emergencia:

CICOTOX: (01) 328-7700

ESSALUD: 411-8000 opción 4.

CISPROQUIM: 0800-50-847

PROCITRUS: 224 - 9026, 226 - 1952.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua del al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el aérea tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

FENGIB

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

MCPA- thioethyl (Phenothiol) 10 g/L

Ácido Giberélico 5 g/L

Aditivos c.s.p. 1L

Reg. N° RCP – SENASA

TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR:

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CÍTRICOS DEL PERÚ

Av. Nicolás Arriola 314 Oficina 903.

La Victoria, Lima- Perú

Teléfonos: +51224 9026, +51226 1952



FORMULADO POR:

SIPCAM INAGRA S.A.

C/ Profesor Beltrán Báguena, 5-11

46009 Valencia- España

Teléfonos: +34 963 483 500/ +34 963 482 721



Contenido Neto: 5 L

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FENGIB es un fitorregulador empleado para regular la floración, cuajado, engorde, uniformidad, productividad en el interior de los frutales, mejorar el calibre comercial, producción uniforme en todo el árbol y para mejorar el cuajado de las flores.

En un recipiente aparte, realizar la mezcla del producto con un poco de agua y remover hasta homogenizar bien; luego verter al tanque y completar el nivel de agua a usar en la aplicación, manteniendo la mezcla en agitación constante.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	RECOMENDACIONES	DOSIS (L/200 L)	P.C. (días)	L.M.R. (p.p.m)
MANDARINA	Mejoramiento de cuajado y desarrollo de frutos	0,18 - 0,20	5	0,05*

PC: Periodo de carencia L.M.R: Límite máximo de residuos
*LMR del I.a. MCPA- thioethyl

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **FENGIB** hasta tres aplicaciones por campaña como máximo, considerando una campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO

Ingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

FENGIB es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso exceptuando los de marcada reacción alcalina y agentes oxidantes.

FITOTOXICIDAD

FENGIB no es fitotóxico usado a las dosis, sistemas de aplicación y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

