



RUC: 20502344367

e-mail: rcarhuallanqui@pointamericas.com

Carta N° 112-2019

Lima, 03 de Diciembre del 2019

Ing. Gerard Blair Arze
Sub- Dirección de Insumos Agrícolas
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
Ministerio de Agricultura
Presente. –

Asunto: Adición de Importador / Distribuidor SANIVEG PERU S.A.C. para FUERZA 200 SC

De nuestra consideración:

Asunto: Adición de Importador / Distribuidor

De mi consideración:

Por medio de la presente, informamos a su despacho que nuestro producto FUERZA 200 SC (i.a.Fipronil) registrado con PQUA N°207-SENASA a partir de la fecha será importado y distribuido por las empresas SANIVEG PERU S.A.C.

Adjuntamos arte de las etiquetas y hoja informativa en formato digital e impreso consignando la inclusión.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, quedamos de ustedes.

Atentamente,


J. Guadalupe Esponda Villar
Representante Legal



LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar este producto bañarse con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en un lugar sombreado, seco y ventilado en su envase original bien cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: pirimidil-pirazoles

- En caso de presentar los síntomas de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- Nota al médico: lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. Si hay contacto con la piel, quítense las ropas contaminadas y lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

CICOTOX 328 7700, ES SALUD: 411 8000 opción 4,
CISPROQUIM: 080050847, POINT ANDINA S.A. (01) 348-1013

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego hufúcelo, triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respolpear una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: pirimidil-pirazoles

- En caso de presentar los síntomas de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- Nota al médico: lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. Si hay contacto con la piel, quítense las ropas contaminadas y lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.



FUERZA[®]

200 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

Composición:

Fipronil200 g/L

Aditivos c.s.p.....1 Litro

Reg. PQUA N° 207-SENASA

Titular de Registro:
POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto 304,
Urb. Santa Patricia
II Etapa, La Molina, Lima-Perú.
Telf.: 348-1018

Importado y Distribuido por:
SANIVEG PERU S.A.C.
Av. San Jenero 235, Urb. Industrial,
Puente Piedra, Lima



Formulado por:
POINT AGRO-CHINA LIMITED
Whan Shi Town,
Yixing Jiangsu 214217, China.

Contenido Neto: 1 L

N° Lote:
Fecha d Firm:
Fecha de Venc:

NO INFLAMABLE



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- FUERZA 200 SC es un insecticida que pertenece al grupo de los Fenil-Pirazoles, afecta principalmente el sistema nervioso central de los insectos bloqueando el canal GABA regulador del cloro, actúa por contacto e ingestión.
- FUERZA 200 SC se emplea diluido en agua, preparar un pre-mezcla con la dosis recomendada en un balde, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.
- FUERZA 200 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras o pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor). Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo del cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS mL por área de 25m ²	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Esplárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodictiposis longifolia</i>	200	21	0.005
Papa	Gorgojo de los andes	<i>Premnotypes suturalis</i>	250	14	0.1
Pimienta	Mosquilla de los brotes	<i>Prodictiposis longifolia</i>	150	14	0.01

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de carencia

ppm: partes por millón

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Puede variar de acuerdo a la incidencia del insecto, también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra.
- Número máximo de aplicaciones por campaña: 2.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

FUERZA 200 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar este producto bañarse con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en un lugar sombreado, seco y ventilado en su envase original bien cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: fenilpirazoles
- En caso de presentar los síntomas de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- Nota al médico: lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. Si hay contacto con la piel, quitarse las ropas contaminadas y lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

Teléfonos de emergencia

CICOTOX 328 7700, ES SALUD: 411 8000 opción 4,
CISPROQUIMI: 060050947, POINT ANDINA S.A. (01) 348-1018

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo, triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respartar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

FUERZA[®] 200 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPENSION CONCENTRADA (SC)


Composición:

Fipronil 200 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 207-SENASA

Titular de Registro:

POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto 304,
Urb. Santa Patricia
II Etapa, La Molina, Lima-Perú.
Telf.: 348-1018



Importado y Distribuido por:

SANIVÉG PERÚ S.A.C.
Av. San Jenaro 235, Urb. Industrial,
Puente Piedra, Lima

Formulado por:

POINT AGRO-CHINA LIMITED
Whan Shi Town,
Yixing Jiangsu 214217, China.



Contenido Neto: 500 ml

N° Lote:
Fecha d Form.:
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- FUERZA 200 SC es un insecticida que pertenece al grupo de los Fenil-Pirazoles, afecta principalmente el sistema nervioso central de los insectos bloqueando el canal GABA regulador del cloro, actúa por contacto e ingestión.
- FUERZA 200 SC se emplea diluido en agua; preparar un pre-mezcla con la dosis recomendada en un balde, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.
- FUERZA 200 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras o pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor). Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo del cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS ml. por hectárea	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Proctipobis longifolia</i>	200	21	0.005
Papa	Gorgojo de los andes	<i>Pemphigus suturalis</i>	250	14	0.1
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Proctipobis longifolia</i>	150	14	0.01

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de carencia

ppm: partes por millón

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Puede variar de acuerdo a la incidencia del insecto, también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra.
- Número máximo de aplicaciones por campaña: 2.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

FUERZA 200 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar este producto bañarse con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en un lugar sombreado, seco y ventilado en su envase original bien cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: pirazoles
- En caso de presentar los síntomas de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- Nota al médico: lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. Si hay contacto con la piel, quítense las ropas contaminadas y lavense con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

Teléfonos de emergencia

CICOTOX 328 7700, ES SALUD: 411 8000 opción 4,
CISPROQUIMI: 080050847, POINT ANDINA S.A. (01) 348-1018

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego indícalo, triturándolo y/o perforándolo, y deposite en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

FUERZA[®]

200 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

Composición:

Fipronil 200 g/L
Aditivos C.S.P. 1 Litro

Reg. PQUA Nº 207-SENASA


Titular de Registro:

POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto 304,
Urb. Santa Patricia
II Etapa, La Molina, Lima-Perú.
Telf.: 348-1018



Importado y Distribuido por:

SANIVEG PERU S.A.C.
Av. San Jénaro 235, Urb. Industrial,
Puente Piedra, Lima



Formulado por:

POINT AGRO-CHINA LIMITED
When Shi Town,
Yixing Jiangsu 214217, China.

ENTREGAMOS CALIDAD

Contenido Neto: 200 L

Nº Lote:
Fecha d Form:
Fecha de Venc:

NO INFLAMABLE



NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- FUERZA 200 SC es un insecticida que pertenece al grupo de los Fenil-Pirazoles, afecta principalmente el sistema nervioso central de los insectos bloqueando el canal GABA regulador del cloro, actúa por contacto e ingestión.
- FUERZA 200 SC se emplea diluido en agua; preparar un pre-mezcla con la dosis recomendada en un balde, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar; agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.
- FUERZA 200 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras o pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor). Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo del cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS ml/1000 litro	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Proctoplosis longifolia</i>	200	21	0.005
Papa	Gorgopio de los andes	<i>Premnotypes suturellus</i>	250	14	0.1
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Proctoplosis longifolia</i>	150	14	0.01

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de carencia

ppm: partes por millón

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Puede variar de acuerdo a la incidencia del insecto, también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra.
- Número máximo de aplicaciones por campaña: 2.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado al producto.

COMPATIBILIDAD

FUERZA 200 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Etiqueta BRIBON x 250 mL. 28,7x15 cm. COEX

LEA ESTA ETIQUETA Y LA HOJA
INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS"

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y
también para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas"

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o
lleve al paciente al médico y muestrele copia de esta etiqueta y
la hoja informativa adjunta"

Teléfonos de emergencia :
CICOTOX: (01) 328-7700
ESSALUD: (01) 411-8000 opción 4
CISPROQUIMI: 080050847,
POINT ANDINA S.A. (01)348 1018

FUERZA[®]
200 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Formul. 200 g/L
Aditivos c. sp. 1L



Titular de registro:
POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto 304,
Urb. Santa Patricia,
Lima-Perú.
Tel.: 348-1018



Importado y Distribuido por:
SANIVÉG PERÚ S.A.C.
Av. San Juanito 235, Urb. Industrial,
Puerto Piedra, Lima.

Formulado por:
POINT AGRO-CHINA LTD.

Contenido Neto: 250 ml
N° de Lote:
Fecha de Form.:
Fecha de Venic.:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO

DANINO



"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico
químicas del producto contenido en este envase
corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz
para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de
acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Banda  Pantone Yellow C

FUERZA[®] 200 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Fipronil 200g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 207 - SENASA

Grupo Químico:

Phenylpyrazoles

Nombre Químico:


(+/-)-5-amino-1-2-(2,6-dichloro-a,a-trifluoro-para-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinyl-pyrazole-3-carbonitril.

Formula empírica:

C₁₂H₄Cl₂F₆N₄O

Peso molecular : 437.15 g/mol

Fórmula estructural:



NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Líquido viscoso

Color: Blanco

Olor: Sin olor característico

Densidad: 1.08 g/ml a 25°C

Titular de Registro:


POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto 304.

Urb. Santa Patricia

II Etapa, La Molina, Lima-Perú.

Tel.: 348-1018



Point
ENTREGAMOS
CALIDAD

Fomulado por:

POINT AGRO-CHINA LTD.

Wan Shi Town, Yixing,

Jiangsu, 214217 China



Importado y Distribuido por:

SANIVÉG PERU S.A.C.

Av. San Jenaro 235. Urb. Industrial.

Puente Piedra, Lima.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

• Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos.

• No aplicar en época de floración.

• Peligroso para peces y otros organismos acuáticos.

• No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

• No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

• Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

• Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

• El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

• En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

PRIMEROS AUXILIOS:

• Grupo químico: Fenil Pirazoles

• En caso de intoxicación, detenga el trabajo, aleje al afectado de la zona de peligro, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

• En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón, incluyendo debajo de las uñas.

• En caso de ingestión, no inducir al vómito a menos que lo recomiende el médico, administrar repetidamente carbón activado en abundante agua.

• En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar aireado alejado de la zona tratada, mantenerlo en reposo, si fuera necesario dar respiración artificial.

• Nota al Médico: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de sostén.

• Si existe la posibilidad de una toxicidad severa, considerar el lavado gástrico protegiendo las vías respiratorias.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: (01) 328-7700

ESSALUD: (01) 411-8000 opción 4

CISPROQUIM: 080050847,

POINT ANDINA S.A. (01)348 1018

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es moderadamente peligroso. No ingerir.
- Es moderadamente irritante dermal. Evitar contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos. Evitar todo contacto directo y prolongado con los ojos.
- Este producto contiene hidrocarburo aromático.
- No permita el ingreso de niños, personas en general y animales a la zona tratada con este producto.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en un lugar aislado, fresco, seco y ventilado alejado de fuentes de calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo, perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FUERZA 200 SC es un insecticida que pertenece al grupo de los Fenil-Pirazoles, afecta principalmente el sistema nervioso central de los insectos bloqueando el canal GABA regulador del cloro, actúa por contacto e ingestión.

FUERZA 200 SC se emplea diluido en agua; preparar un pre-mezcla con la dosis recomendada en un balde, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

FUERZA 200 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras o pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor). Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo del cultivo.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

- Puede variar de acuerdo a la incidencia del insecto, también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra.
- Número máximo de aplicaciones por campaña: 2.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

FUERZA 200 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (mL/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplotis longitilla</i>	200	21	0.005
Papa	Gorgojo de los andes	<i>Premnotypes suturicallus</i>	250	51	0.02
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplotis longitilla</i>	150	14	0.01

PC= Período de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos



LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar este producto bañarse con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en un lugar sombreado, seco y ventilado en su envase original bien cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: pirazoles
- En caso de presentar los síntomas de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- Nota al médico: lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. Si hay contacto con la piel, quítense las ropas contaminadas y lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX 328 7700, ES SALUD: 411 8000 opción 4,
CISPROQUIM: 080050647, POINT ANDINA S.A. (01) 348-1018

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilice, triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

FUERZA[®]

200 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

Composición:

Fipronil 200 g/L
Aditivos c.s.p. 1 litro

Reg. PQUA N° 207-SENASA

Titular de Registro:

POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto 304,

Urb. Santa Patricia

II Etapa, La Molina, Lima-Perú.

Tel.: 348-1018

Formulado por:

POINT INTERNATIONAL LTD.

42 St. Margarets Grove Twickenham

U.K. TW 1 1UG United Kingdom




Importado y Distribuido por:

SANIVÉG PERU S.A.C.

Av. San Jenaro 235, Urb. Industrial,

Puente Piedra, Lima



Point
ENTREGAMOS CALIDAD

Contenido Neto: 500 ml

N° Lote:

Fecha d Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE



NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- FUERZA 200 SC es un insecticida que pertenece al grupo de los Fenil-Pirazoles, afoda principalmente el sistema nervioso central de los insectos bloqueando el canal GABA regulador del cloro, actúa por contacto e ingestión.
- FUERZA 200 SC se emplea diluido en agua; preparar un pre-mezcla con la dosis recomendada en un balde, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.
- FUERZA 200 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadores o pulverizadores de mochila, estacionarias o montadas a tractor), iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo del cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS ml por hectárea	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Esparago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiptosis longifolia</i>	200	21	0.005
Papa	Gorgojo de los andes	<i>Premnotypes sturcellus</i>	250	14	0.1
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiptosis longifolia</i>	150	14	0.01

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de carencia

ppm: partes por millón

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Puede variar de acuerdo a la incidencia del insecto, también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra.
- Número máximo de aplicaciones por campaña: 2.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

FUERZA 200 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en esta envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
 - Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - Después de usar este producto bañarse con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
 - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - Almacenar el producto en un lugar sombreado, seco y ventilado en su envase original bien cerrado.
- #### PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: fenilpirazoles
- En caso de presentar los síntomas de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
 - Nota al médico: lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. Si hay contacto con la piel, quitarse las ropas contaminadas y lavarse con abundante agua y jabón.
 - No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

Teléfonos de emergencia

CICOTOX 328 7700, ES SALUD: 411 8000 opción 4,
CISPROQUIM: 080050847, POINT ANDINA S.A. (01) 348-1018

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo, triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

FUERZA[®] 200 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

Composición:

Fipronil 200 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 207-SENASA

Titular de Registro:

POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto 304,
Urb. Santa Patricia
II Etapa, La Molina, Lima-Perú.
Telf.: 348-1018



Importado y Distribuido por:

SANIVÉG PERU S.A.C.
Av. San Jenaro 235, Urb. Industrial,
Puente Piedra, Lima

Formulado por:

POINT INTERNATIONAL LTD.
42 St. Margarets Grove Twickenham
TW 1 1JG United Kingdom

ENTREGAMOS
CALIDAD

Contenido Neto: 200 L

N° Lote:
Fecha d Form.:
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE



NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- FUERZA 200 SC es un insecticida que pertenece al grupo de los Fenil-Pirazoles, afecta principalmente el sistema nervioso central de los insectos bloqueando el canal GABA regulador del cloro, actúa por contacto e ingestión.
- FUERZA 200 SC se emplea diluido en agua; preparar un pre-mezcla con la dosis recomendada en un balde, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar; agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.
- FUERZA 200 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadores o pulverizadores de mochila, estacionarias o montadas a tractor). Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo del cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS ml. por alifera 20L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplotis longifolia</i>	200	21	0.005
Papa	Gorgopo de los andes	<i>Premnotypes sulfurcalis</i>	250	14	0.1
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplotis longifolia</i>	150	14	0.01

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de carencia

ppm: partes por millón

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Puede variar de acuerdo a la incidencia del insecto, también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra.
- Número máximo de aplicaciones por campaña: 2.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

FUERZA 200 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en esta envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Etiqueta BRIBON x 250 mL. 28,7x15 cm. COEX

LEA ESTA ETIQUETA Y LA HOJA
INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS"

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y
también para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas"

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o
lleve al paciente al médico y muestrele copia de esta etiqueta y
la hoja informativa adjunta"

Teléfonos de emergencia :
CICOTOX: (01) 328-7700
ESSALUD: (01) 411-8000 opción 4
CISPROQUIMI: 06065847,
POINT ANDINA S.A. (01)348 1018

FUERZA[®]
200 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Fipronil.....200 g/L
Aditivos.....c.sp. 1L

Reg. PQUA N° 287 - SENASA

Titular de registro:

POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto 304,

II Etapa, La Molina, Lima-Perú.

Tel.: 348-1018

Formulado por:

POINT INTERNATIONAL LTD.

Contenido Neto: 250 ml

N° de Lot:

Fecha de Form.:

País de Venic.:



Importado y Distribuido por:

SANIVÉG PERÚ S.A.C.

Av. San Jacinto 235. Urb. Industrial.

Puerto Pedra, Lima.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico
químicas del producto contenido en este envase
corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz
para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de
acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



NO CORROSIVO
NO INFLAMABLE
NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO



Banda ● Pantone Yellow C

FUERZA[®]

200 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Fipronil 200g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 207 - SENASA

Grupo Químico :

Phenylpyrazoles

Nombre Químico :


(+/-)-5-amino-1-2-(2,6-dichloro-a,a,a-trifluoro-para-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinyl-pyrazole-3-carbonitril.

Formula empírica:

C₁₂H₄Cl₂F₆N₄O

Peso molecular : 437.15 g/mol

Fórmula estructural:



NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Líquido viscoso

Color: Blanco

Olor: Sin olor característico

Densidad: 1.08 g/ml a 25°C

Titular de Registro:


POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto 304.

Urb. Santa Patricia

II Etapa. La Molina. Lima-Perú.

Tel.: 348-1018



Point

ENTREGAMOS CALIDAD

Formulado por:

POINT INTERNATIONAL LTD.

42 St. Margarets Grove Twickenham

TW 1 1JG United Kingdom



SANIVEG PERU S.A.C.

Importado y Distribuido por:

SANIVEG PERU S.A.C.

Av. San Jenaro 235. Urb. Industrial.

Puente Piedra, Lima.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

• Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos.

• No aplicar en época de floración.

• Peligroso para peces y otros organismos acuáticos.

• No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

• No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

• Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

• Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

• El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

• En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

PRIMEROS AUXILIOS:

• Grupo químico: Fenil Pirazoles

• En caso de intoxicación, detenga el trabajo, aleje al afectado de la zona de peligro, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.

• En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón, incluyendo debajo de las uñas.

• En caso de ingestión, no inducir al vómito a menos que lo recomiende el médico, administrar repetidamente carbón activado en abundante agua.

• En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar aireado alejado de la zona tratada, mantenerlo en reposo, si fuera necesario dar respiración artificial.

• Nota al Médico: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de sostén.

• Si existe la posibilidad de una toxicidad severa, considerar el lavado gástrico protegiendo las vías respiratorias.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: (01) 328-7700

ESSALUD: (01) 411-8000 opción 4

CISPROQUIM: 080050847

POINT ANDINA S.A. (01)348 1018

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es moderadamente peligroso. No ingerir.
- Es moderadamente irritante dérmica. Evitar contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos. Evitar todo contacto directo y prolongado con los ojos.
- Este producto contiene hidrocarburo aromático.
- No permita el ingreso de niños, personas en general y animales a la zona tratada con este producto.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en un lugar aislado, fresco, seco y ventilado alejado de fuentes de calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo, perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FUERZA 200 SC es un insecticida que pertenece al grupo de los Fenil-Pirazoles, afecta principalmente el sistema nervioso central de los insectos bloqueando el canal GABA regulador del cloro, actúa por contacto e ingestión.

FUERZA 200 SC se emplea diluido en agua; preparar un pre-mezcla con la dosis recomendada en un balde, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

FUERZA 200 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras o pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor). Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo del cultivo.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

- Puede variar de acuerdo a la incidencia del insecto, también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra.
- Número máximo de aplicaciones por campaña: 2.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

FUERZA 200 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (mL/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifolia</i>	200	21	0.005
Papa	Gorgojo de los andes	<i>Premnotrypes suturalis</i>	250	51	0.02
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifolia</i>	150	14	0.01

PC= Período de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

