

Cevya®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICION:

Mefenitrufluonazol	400 g/L
Aditivos	c.s.p. 1 L

Req. PQUA N° 2589-SENASA



We create chemistry

FORMULADO POR:

BASF S.A.

Av. Brasil, 791

~~Bairro Eng. Ne~~

Guaratinguetá SP - Brasil

CONTENIDO NETO: 1 L

Nº de lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMMABLE** **NO EXPLOSIVO**

® Marca Registrada BASF

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

06

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Cevya® es un fungicida con mefenitruconazol ingrediente activo sistémico, con acción preventiva y curativa sobre una amplia gama de patógenos en las plantas. Mefenitruconazol pertenece al grupo de los triazoles, y, por lo tanto, es un inhibidor de C-14 demetilasa en la biosíntesis del esterol. Código FRAC 3.
- Aplicar Cevya® en aspersión foliar, con equipo manual o mecánico con presión constante. Calibre el equipo antes de aplicar el producto. Llene el tanque o cilindro hasta un tercio con agua (limpia), agregue la dosis recomendada para la enfermedad y cultivo, completar con agua y acilar constantemente hasta lograr una mezcla homogénea.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/Ha	PC* (dias)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico			
Arándano	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.1	20	5.0
	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria alternata</i>	0.45		
	Oidiois	<i>Oidium</i> spp.	0.4 – 0.5		
	Rhizoctoniasis	<i>Rhizoctonia solani</i>	0.4		
	Mancha púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.3		
Cebolla	Oidiois	<i>Sclerotinia leuotricha</i>	0.4	7	0.2
Manzano	Oidiois	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	0.3	14	1.5
Melón	Oidiois	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	0.3	0	0.5
Palto	Cladosporium	<i>Cladosporium herbarum</i>	1.0	15	1.0
	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.1		
Sandía	Oidiois	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	0.3	1	0.5
Vid	Oidiois	<i>Erysiphe necator</i>	0.35 – 0.45	15	1.5
	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.1		

PC: Período de Carenzia LMR: Límite máximo de residuos

Gasto de agua recomendado en melón: 350 a 400L/Ha; sandía: 400 L/Ha

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar Cevya®, una aplicación por campaña por año para los cultivos de arándano, arroz, cebolla, manzano, melón, palto y sandía y como máximo hasta dos aplicaciones por campaña por año para el control de oídio en vid, considerando una frecuencia de 14 días entre aplicaciones; para el control de Botrytis en vid considerar sólo una aplicación por campaña año.

Se debe aplicar a la observación de los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda alternar con otros productos de diferente mecanismo de acción como estrategia de manejo anti-resistencia.

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda reingresar pasadas las 12 horas de realizado el tratamiento.

COMPATIBILIDAD:

Se debe evitar aplicar **Cevya**® con productos de reacción alcalina, sin embargo, se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto"