

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

- Este producto es DÁNILO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evitar respirar.
- Causa daño a los ojos
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Evitar contacto con la piel y la ropa
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para conservar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Organofosforado
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al médico inmediatamente al paciente y muéstrela la Etiqueta.
 - En caso de ingestión, enjuague la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
 - En caso de contacto con la piel, retire la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
 - En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, incluso bajo los párpados.
 - En caso de inhalación, retire a la persona del área contaminada y trasládela a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
 - Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático

Teléfonos de emergencia: CICOTOX: 0800-113040

ESSALUD: 4118000 / 0801-10200

GLOBAL ORGANICS PERU S.A.C.: 4769761

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u artrópodos beneficios.
- No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños
- Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

AGROCELHONE® CE

FUNGICIDA AGRICOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

COMPOSICIÓN:

Chloropicrin.....945 g/L

Aditivos.....c.s.p. hasta 1 L

Reg. PQUA N°-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO

IMPORTADOR - DISTRIBUIDOR:

GLOBAL ORGANICS PERU SAC

Av. Aviación N°2895 - Int. 301 - San Borja - Lima

Teléfono: 4769761

E-mail: info@globalorganicspe.com

Web: www.globalorganicspe.com

Formulado por:

Agroquímicos de Levante, S.A.

Pol. Ind. Castilla - calle Vial n° 5

46380 - CHESTE (Valencia) España

Teléfono: +(34) 96 251 10 00 Fax: +(34) 96 251 14 61

e-mail: aglsa@arrakis.es

CONTENIDO NETO: 37,5 Litros

N° Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

@= Marca Registrada

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGROCELHONE CE, es un fungicida que actúa por contacto, su mecanismo de acción es hacia el sistema nervioso consiste en interferir o inhibir la enzima ATPasa que regula los iones de Ca de la membrana celular y de esta manera impide el rápido retorno de equilibrio en la membrana nerviosa (equilibrio Na/K)

Se aplica sobre suelos desnudos en presembra o preplantación de diversos cultivos para el control de hongos del suelo que atacan a raíz y cuello. El suelo debe estar mullido, libre de terrones y restos vegetales, relativamente húmedo, con suficiente temperatura y cubierto, previa comprobación del correcto funcionamiento del sistema de riego de ser el caso.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Uso	Nombre común	Nombre científico	Dosis		LWR
			ml/m²	L/ha	
Suelo agrícola desnudo con presencia demostrada de la plaga	Marchitez	Fusarium oxysporum	25	250	NA

(*) Período de carencia y LMR: No aplican, por el modo de uso del producto NA: No Aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar 1 sola vez por campaña, en suelos desnudos, previa evaluación de la plaga.

Máximo aplicar 250 L/ha.

No aplicar cuando los cultivos aledaños se encuentran en floración.

Las aplicaciones pueden ser de 3 tipos:

1. APLICACIÓN POR EL SISTEMA DE RIEGO:

La incorporación del producto en el suelo se lleva a cabo con la bomba de inyección la cual succiona el producto del bidón y lo impulsa al riego.

El punto de inyección del producto puede ser hecho desde el cabezal de riego, preparando en la tubería principal el punto de inyección. Colocar lámina plástica sobre el área a ser tratada. Cuando la inyección del producto ha terminado, se deben dar unos 30 min. de riego y así lavaremos el circuito de riego y además la bomba colocando un cubo de agua limpia en la succión. Luego de 10-14 días levantar la cubierta plástica y airear el suelo entre 2 a 5 días, dar riegos fuertes y sembrar.

2. APLICACIÓN POR EL SISTEMA DE RIEGO CON CINTA ENTERRADA

La incorporación del producto en el suelo se lleva a cabo con la bomba de inyección la cual succiona el producto del bidón y lo impulsa al riego.

El punto de inyección del producto puede ser hecho desde el cabezal de riego, preparando en la tubería principal el punto de inyección. Enterrar las cintas de riego entre 15 a 18 cms de profundidad. No usamos lámina plástica. Cuando la inyección del producto ha terminado, se deben dar unos 30 min. de riego y así lavaremos el circuito de riego y además la bomba colocando un cubo de agua limpia en la succión. Luego de 10-14 días desenterrar las cintas, si es necesario, airear el suelo entre 2 a 5 días, dar riegos fuertes y sembrar

3. APLICACIÓN POR EL SISTEMA DE INYECCIÓN MECÁNICA:

Antes de la aplicación, se debe preparar el suelo de manera profunda, es decir por lo menos a 50 o 60 centímetros de profundidad. El empleo del inyector le permite una aplicación de manera eficiente y cómoda y sin necesidad de poseer riego tecnificado. Adaptamos el implemento que contiene los inyectores al tractor y a las condiciones del campo, el inyector va detrás de un surcador en forma de cincel que es el equipo que hace el surco hasta una profundidad de 45 cm., para que inyecte el producto regulado en la dosis a aplicar y detrás va otro aparato que va sellando el surco para evitar la fuga del producto. A los 10-14 días de aplicado el producto, se procederá a ventilar el campo aplicado entre 2 a 5 días dar riegos fuertes y sembrar. No se requiere de malha plástica.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar hasta pasados los 21 días después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: AGROCELHONE® CE no es compatible con otros productos, por lo que se debe aplicar solo.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DÁNILO

