

Tambor

SIZE: 14.0 x 28.0 cm

19/10/2023

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
  - Se debe evitar el contacto con los ojos, piel y ropa.
  - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
  - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
  - Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. No exponer a radiación solar.
  - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
  - Durante el transporte y manipulación, proteger de la luz solar y alta temperatura.
  - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
  - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
  - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**
- Puede causar irritación dérmica y ocular. En caso de intoxicación, retire a la persona de la zona peligrosa, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
  - En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si el paciente está inconsciente. Obtenga atención médica.
  - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados, consiga atención médica.
  - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos. Si el enrojecimiento, picazón o desarrolla una sensación de quemazón continua, consiga atención médica.
  - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada a un área de aire fresco manteniéndolo en descanso. Si no está respirando, administre respiración artificial; si respira con dificultad, dé oxígeno. Llamar inmediatamente a un médico.
  - No tiene antídoto específico realizar tratamiento sintomático.
  - Teléfonos de emergencia llamar:

SAMU: 106 ó Titular NOVAGRO-AG S.A.C.: +51 (044) 273330

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**  
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Aplicación: Respetar una franja de seguridad de 10 metros con relación a cuerpos de agua.
- No permita animales en las zonas tratadas.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



**COMPOSICIÓN:**

*Trichoderma harzianum* (1X10<sup>11</sup> CFU/kg, CEPA: TP-2).....33 g/Kg  
*Bacillus subtilis* (1X10<sup>11</sup> CFU/kg, CEPA: KN-42).....33 g/Kg  
Aditivos..... c.s.p.1 Kg

Registro N° 086 - SENASA - PBA - ACBM

**TITULAR DEL REGISTRO:**

**NOVAGRO-AG S.A.C.**  
Car. Paita-Sullana Km. 3 Mza. B Lote 13 Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita - Paita, Perú . Teléfono: +51 (044) 273330  
ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

**FORMULADOR:**

**NOVAGRO-AG S.A.C.**  
Car. Paita-Sullana Km. 3 Mza. B Lote 13 Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita - Paita, Perú . Teléfono: +51 (044) 273330  
ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

**DISTRIBUIDOR:**

**NOVAGRO-AG S.A.C.**  
Car. Paita-Sullana Km. 3 Mza. B Lote 13 Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita - Paita, Perú . Teléfono: +51 (044) 273330  
ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com



Fecha de Formulación :  
N° de Lote :  
Contenido Neto : **25 Kg**  
Fecha de Vencimiento :

**NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**AWESOME-AG® DUO** es un fungicida biológico a base del hongo *Trichoderma harzianum* y la bacteria *Bacillus subtilis*.  
*Trichoderma harzianum* es un hongo hiperparásito que actúa por medio de competencia por nutrientes, producción de metabolitos antifúngicos, enzimas hidrolíticas y micoparasitismo. *Bacillus subtilis*, detiene la germinación de las esporas de los hongos fitopatógenos, rompiendo el tubo germinativo porque produce una zona de inhibición que restringe el desarrollo de los hongos. Asimismo, detiene el crecimiento del micelio por competencia de nutrientes y espacio en la superficie de la hoja.  
Método y modo de aplicación: Aplicación terrestre por aspersión foliar. Se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución al tanque o cilindro completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Debe usarse con agua de pH neutro o levemente ácido.  
Se recomienda lograr humedad uniforme en el lomo de la plantación de manera de favorecer la instalación de *Trichoderma*. No dejar el producto para el día siguiente una vez que se haya preparado.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200L	Kg/Ha		
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.6 - 0.7	—	N.A	N.A
Arándano	Roya	<i>Thekopsora minima</i>	0.7 - 0.8	—	N.A	N.A
	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	—	1.5 - 2.5	N.A	N.A
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.6 - 0.7	—	N.A	N.A

PC: Periodo de Carencia | LMR: Límite Máximo de Residuos | N.A.: No aplica

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda realizar 2 aplicaciones por campaña por año, con un intervalo de 21 días entre cada aplicación en el cultivo de vid, y un intervalo de 30 días en el cultivo de palto. Para arándano, se recomienda realizar hasta 3 aplicaciones por campaña por año, con un intervalo de 15 días entre cada aplicación. Se debe aplicar en forma preventiva o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar la aplicación durante las horas de menor insolación.

**PERIODO DE REINGRESO:** 12 horas.

**COMPATIBILIDAD**

El producto es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común. No debe mezclarse con productos alcalinos o con productos que tienen un bactericida. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad con otros productos.

**FITOTOXICIDAD**

**AWESOME-AG® DUO** no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

“El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.”



**PRECAUCIÓN**

