

8 cm

12 cm

# Galeno

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)**

**Composición:**

Azoxystrobin.....500 g/kg

Aditivos.....c.s.p.1 kg

**Reg. PQUA N° 622 - SENASA**

**Titular del registro:**

**SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO**

**Formulado por:**

**PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD**  
M-77, 1st & 1ind Floor, M-Block Market,  
Greater Kailash Part-II,  
New Delhi-110 048, India

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

**SOCIEDAD ANONIMA *Fausto* Piaggio**

Av. Guillermo Dansey 2045,

Cercado de Lima, Perú.

Telf.: 464-2222 Fax: 464-2211

Email: ventas@piaggio.com.pe

RUC: 20100244471



**Contenido Neto: 40 g**

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

8 cm

12 cm

## LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“Manténgase bajo llave, fuera del alcance de los niños”

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta”

En caso de emergencia llamar a los teléfonos:

ESSALUD EN LINEA: 411-8000 (Opción 4)

CETOX: 080071911 (Línea gratuita)

CISPROQUIM: 0800-50847

CICOTOX 0800-13-040

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE DOSIS Y USOS:

| CULTIVO   | ENFERMEDAD       |                               | DOSIS       |         | Periodo de carencia* (días) | LMR** (ppm) |
|-----------|------------------|-------------------------------|-------------|---------|-----------------------------|-------------|
|           | Nombre común     | Nombre científico             | g/cil 200 L | g/ha    |                             |             |
| Alcachofa | Oidium           | <i>Leveillula Taurica</i>     | 60          | -       | 0                           | 5           |
| Espárrago | Mancha púrpura   | <i>Stemphylium vesicarium</i> | 80          | 200     | 7                           | 0.01        |
| Fresa     | Podredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i>       | 100         | -       | 0                           | 10          |
| Palto     | Botrytis         | <i>Botrytis cinerea</i>       | 40-55       | 150-200 | 0                           | 0.05        |
| Papa      | Tizon temprano   | <i>Alternaria solani</i>      | 80          | -       | 7                           | 7           |
| Vid       | Oidium           | <i>Erysiphe necator</i>       | 50          | 200     | 14                          | 2           |
|           | Moho gris        | <i>Botrytis cinerea</i>       | 40-60       | 142-225 | 14                          | 2           |

\*Última aplicación antes de la cosecha

\*\*Límite máximo de residuos (ppm)

n.d.: no determinado

### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase concuerdan con la descripción indicada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

