

12 cm

19 cm

Galeno

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Azoxystrobin.....500 g/kg
Aditivos.....c.s.p.1 kg

Reg. PQUA N° 622 - SENASA

Titular del registro:
SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO

Formulado por:
**ZHEJIANG CHEMICALS IMPORT
AND EXPORT CORPORATION**
No. 37 Qing Chun Road, Hangzhou,
Zhejiang Province, P.R. China.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
SOCIEDAD ANONIMA *Fausto***Piaggio**

Av. Guillermo Dansey 2045,
Cercado de Lima, Perú.
Telf.: 464-2222 Fax: 464-2211
Email: ventas@piaggio.com.pe
RUC: 20100244471



Contenido Neto: 100 g

Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

12 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Ligeramente peligroso por inhalación.
- Moderadamente irritante a los ojos
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Este producto es mortal si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, máscara contra el polvo, respirador u otros) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No re-envasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Estrobilurina
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar el paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos enjuagarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel retirar la ropa contaminada y limpiar la zona expuesta con agua abundante y jabón.
- En caso de ingestión no inducir el vómito; avisar a un médico. Si la persona está consciente dar de beber agua.
- En caso de inhalación colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorizar que no exista dificultad respiratoria, si existe practicar respiración artificial.

Nota al médico: trátese sintomáticamente, no tiene antídoto específico.

En caso de emergencia llamar a los teléfonos:

ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (Opción 4)

CETOX: 0800/71911 (Línea gratuita)

CISPROQUIM: 0800-50847

CICOTOX 0800-13-040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir el ingreso de animales al área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

GALENO es un fungicida sistémico y translaminar del grupo de las estrobilurinas. Posee propiedades protectantes, curativas y erradicantes. Inhibe la germinación de las esporas y el crecimiento micelial, también muestra actividad antiesporulante. Agregar lentamente los gránulos en el tanque y mantenerlo en agitación mientras se está aplicando. No pre-mezclar el producto.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña/año. El intervalo entre aplicaciones de **GALENO** es de 20 días. Aplicar cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción enfermedad-cultivo. Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con productos de reacción alcalina. Evitar agentes oxidantes. En caso de duda se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad a la dosis recomendada.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico si es usado a la dosis y uso recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase concuerdan con la descripción indicada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		Periodo de carencia* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	g/cil 200 L	g/ha		
Alcachofa	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	60	-	0	5
Espárrago	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	80	200	7	0.01
Fresa	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	100	-	0	10
Palto	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	40-55	150-200	0	0.05
Papa	"Tizon temprano"	<i>Alternaria solani</i>	80	-	7	7
Vid	"Oidiosis"	<i>Erysiphe necator</i>	50	200	14	2
	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	40-60	142-225	14	2

*Última aplicación antes de la cosecha

**Límite máximo de residuos (ppm)

N.A.: no aplica



19 cm