


31,2 ± 0,3

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”


Nombre comercial: MILITAR® 247 SC
Nombre común: Lambda-cyhalothrin + Thiamethoxam
Registro PQUA N° 2597 - SENASA

Composición:
Lambda-cyhalothrin 107 g/L
Thiamethoxam 142.1 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1L

Fórmula empírica; Peso molecular:
Lambda-cyhalothrin: C₂₃H₁₉ClF₃NO₃; 449.85 g/mol.
Thiamethoxam: C₈H₁₀ClN₃O₃S; 291.71 g/mol.
Fórmula estructural:



Lambda-cyhalothrin



Thiamethoxam

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO FORMULADO
• Apariencia: Líquido viscoso
• Color: Blanquecino
• Olor: Ligero
• Almacenamiento: MILITAR® 247 SC conserva sus características físicas y de composición bajo condiciones de almacenamiento a temperatura ambiente y en su envase original y sellado.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
• Este producto es tóxico si se ingiere.
• Peligroso si es inhalado, evite respirar aspersión.
• Este producto causa irritación moderada a los ojos.
• Evitar contacto con los ojos, piel y ropa.
• No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
• Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
• Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
• No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas y forrajes.
• Después de usar el producto, cambiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
• Usar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

• Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
• Realizar la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
• Grupo químico: Piretroide/neonicotinoide.
• En caso de intoxicación por ingestión llevar al paciente inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta.
• No administrar nada a una persona inconsciente, obtener ayuda médica de inmediato.
• En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua por 15 minutos y llevar al paciente al médico.
• En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón por 20 minutos.
• En caso de intoxicación por inhalación, llevar a la persona a un lugar abierto y proporcionarle aire fresco, despejar las ropas alrededor del cuello y el pecho. Brindar respiración artificial y llevar al paciente al médico.
• No existe antídoto específico. El tratamiento será sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
SICSAC: (01) 644-9297



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
• Tóxico para las abejas u otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración.
• Muy tóxico para organismos acuáticos.
• No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
• No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
• Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
• Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
• Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
• En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
• El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MILITAR® 247 SC está compuesto por lambda-cyhalothrin, un insecticida piretroide de contacto e ingestión y de amplio espectro y thiamethoxam, un insecticida neonicotenoide altamente sistémico y de amplio espectro. Presenta un buen efecto residual sobre insectos del suelo y follaje. En pimiento se recomienda la aplicación foliar y en brotes.

MILITAR® 247 SC se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación.

MILITAR® 247 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200L	L/ha		
ESPÁRRAGO	Chinche	<i>Euschistus convergens</i>	0.15-0.25	-	21	0.02(1) 0.05(2)
MAÍZ	Chinche del maíz	<i>Sthenarides carmelitana</i>	0.15-0.20	-	21	0.02(1) 0.05(2)
MANDARINA	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	0.1-0.125	-	28	0.2(1) 0.5(2)
PALTO	Queresa	<i>Florinia floridula</i>	0.1-0.125	-	14	0.2(1) 0.5(2)
PAPA	Gorgojo de los andes	<i>Premnotypus aturicallus</i>	0.25-0.30	-	21	0.01(1) 0.3(2)
PIMIENTO	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.125	0.145	5	0.2(1) 0.1(2)
VID	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	0.15	-	21	0.08(1) 0.5(2)

P.C.: Período de Carenia (1) Lambda-cyhalothrin (2) Thiamethoxam L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar un máximo de 1 aplicación por campaña/año para el cultivo de espárrago, pimiento, vid y mandarina. Para papa realizar 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña al año, dosis máxima de 0.375 L/ha (gasto de agua 250 L/ha). Para palto realizar como máximo 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña al año (gasto de agua máximo de 600 L/ha). En maíz se recomienda realizar como máximo 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña al año, cantidad máxima de aplicación por hectárea: 0.35 L/ha. Para el momento de aplicación se deberá evaluar la incidencia de la plaga y las condiciones óptimas de su desarrollo para proceder a la aplicación de MILITAR® 247 SC. También dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y la época de siembra. Usar la menor dosis en baja incidencia y la mayor dosis a mayor incidencia de la plaga. No aplicar en época de floración.

PERIODO DE REINGRESO

Se puede reingresar al campo con equipo de protección durante las primeras 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

El producto es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y abonos foliares utilizados convencionalmente en los cultivos recomendados. Antes de efectuar las mezclas, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con el plaguicida que se desea aplicar.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

MILITAR®
247SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)



Titular del Registro:
SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.
Av. Javier Prado Este N°6210 - Oficina N° 306
La Molina. Lima - Perú. Telf.: (01) 644-9297

Formulado por:
JIXI AGROSINO BIOTECH CO. LTD.
No. 7 Huanyang East Road, Jixi County
Anhui Province. China.

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



13,0 ± 0,3

2,0