

**“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO”**

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Composición:

Lambda-cyhalothrin	107 g/L
Thiamethoxam	142.1 g/L
Aditivos.....	c.s.p. 1L

Chemical structures of **Lambda-cyhalothrin** and **Thiamethoxam** are shown. Lambda-cyhalothrin is a pyrethroid insecticide, and Thiamethoxam is a neonicotinoid insecticide.

- Apariencia: Líquido viscoso
- Color: Blanquecino
- Color: Ligero
- Almacenamiento: **MILITAR® 247 SC** conserva sus características físicas y de composición bajo condiciones de almacenamiento a temperatura ambiente y en su envase original y sellado.


NO EXPLOSIVO

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar aspersión.
- Este producto causa irritación moderada a los ojos.
- Evitar contacto con los ojos, piel y ropa.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas y forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Usar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

- En caso de intoxicación por ingestión llevar al paciente inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta.
- No administrar nada a una persona inconsciente, obtener ayuda médica de inmediato.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua por 15 minutos y llevar al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón por 20 minutos.
- En caso de intoxicación por inhalación, llevar a la persona a un lugar abierto y proporcionarle aire fresco, desvestir las ropas alrededor del cuello y el pecho. Brindar respiración artificial y llevar al paciente al médico.
- No existe antídoto específico. El tratamiento será sintomático.

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

- Tóxico para las abejas u otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración.
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.



MILITAR® 247 SC está compuesto por lambda-cyhalothrin, un insecticida piretroide de contacto e ingestión y de amplio espectro y thiamethoxam, un insecticida neonicotenoide altamente sistémico y de amplio espectro. Presenta un buen efecto residual sobre insectos del suelo y follaje. En pimiento se recomienda la aplicación foliar y en brotes.

MILITAR® 247 SC se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación.

MILITAR® 247 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse de que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (dias)	L.m. (m ²)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200L	L/ha		
ESPÁRRAGO	Chinche	<i>Euschistus convergens</i>	0.15 - 0.25	-	21	0.05/0.02
MANDARINA	Queresa coma	<i>Lepidosaphes becki</i>	0.1-0.125	-	28	0.2/0.5/1
PALTO	Queresa	<i>Fiorinia florinae</i>	0.1-0.125	-	14	0.2/0.5/1
PAPA	Gorgolo de los andes	<i>Fremontomyia suttonianalis</i>	0.25-0.30	-	21	0.01/0.03/0.05
PIMIENTO	Mosquilla de los brotes	<i>Prodidiplosis longifila</i>	0.125	0.145	5	0.2/0.5/1
VID	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	0.15	-	21	0.08/0.5/1

P.C.: Período de Carencia (1) Lambda-cyhalothrin L.M.R.: Límite Máximo de Residuos
(2) Thiamethoxam

Se recomienda realizar un máximo de 1 aplicación por campaña/año para el cultivo de pimiento, vid y mandarina. Dosis máxima: 0.75 L/ha. Para papa realizar 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña al año, dosis máxima de 0.375 L/ha (gasto de agua 250 L/ha). Para espárrago aplicar 1 vez por campaña/año, dosis máxima de 0.75 L/ha (gasto de agua 600L/ha). Para palto realizar como máximo 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña al año (gasto de agua máximo de 600 L/ha). Para el momento de aplicación se deberá evaluar la incidencia de la plaga y las condiciones óptimas de su desarrollo para proceder a la aplicación de **MILITAR® 247 SC**. También dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y la época de siembra. Usar la menor dosis en baja incidencia y la mayor dosis a mayor incidencia de la plaga. No aplicar en época de floración.

Se puede reingresar al campo con equipo de protección durante las primeras 24 horas de aplicado el producto.

El producto es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y abonos foliares utilizados convencionalmente en los cultivos recomendados. Antes de efectuar las mezclas, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con el plaguicida que se desea aplicar.

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)



Titular del Registro:
SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.
 Av. Javier Prado Este N°6210 - Oficina N° 306
 La Molina. Lima - Perú. Telf.: (01) 644-9297

Formulado por:
JIXI AGROSINO BIOTECH CO. LTD.
No. 7 Huanyang East Road, Jixi County
Anhui Province. China.

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.

