"I FA CUIDADOS AMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECALICIONES Y ADVERTENCIAS DE LISO Y APLICACIÓN

- DAÑINO. No ingerir v evitar la respiración (aspersión).
- Causa irritación moderada a los ojos
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos medicinas bebidas ni forraies

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Piretroide
- No existe antidoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación o ingestión conseguir asistencia médica y presentar etiqueta del producto

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 / Teléf. del titular: (01) 611-0831 CISPROOLIIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuaque tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. TRIPLE LAVADO
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abeias y artrópodos benéficos.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos
- No contaminar ríos, estanques o arrovos con los desechos o envases vacios.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin

Medidas: 19.3 cm (ancho) x 6.3 cm (alto)

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA CÁPSULA EN SUSPENSIÓN (C

Composición Lambda-cyhalothrin. Aditivos

Reg. PQUA Nº 2180 - SENASA ARYSTA LIFESCIENCE PERUS A C









NO EXPLOSIVO

..250 a/L

csn1l

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TRINICA 250 CS es un insecticida del grupo de los piretroides que actúa por contacto e ingestión, a nivel del sistema nervioso del insecto, a través de los canales de sodio, produciendo sobre-excitación nerviosa y luego la muerte

TRINICA 250 CS, se prepara diluvendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Mantener el caldo en constante agitación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

	Plaga		Dosis		P.C.	LMR
Cultivo	Nombre común	Nombre científico	L/200L	ml/200L	(días)	(ppm)
Cebolla	Thrips	Thrips tabaci	0.025	25	14	0.1

LMR: Límite mávimo de residuos

ERECLIENCIA V ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Aplicar previa evaluación de la plaga.

- Para el cultivo de cebolla se recomienda aplicar como máximo 2 veces por campaña, es decir

como máximo aplicar 0.05 L/200L y siempre previa evaluación.

P.C.: Periodo de carencia

- Peligroso para abeias. PERIODO DE REINGRESO: Reingresar a la zona tratada después de 24 horas

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneia de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuniquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.















Titular de Registro:

Importador y distribuidor

Fecha de Formulación:

CONTENIDO NETO: 0.2

NO CORROSIVO

Fecha de vencimientos

Formulador:

LIPI LIMITED

FARMEX S.A.

No. de Lote:





















"I FA CUIDADOS AMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECALICIONES Y ADVERTENCIAS DE LISO Y APLICACIÓN

- DAÑINO. No ingerir v evitar la respiración (aspersión).
- Causa irritación moderada a los ojos
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos medicinas bebidas ni forraies

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Piretroide
- No existe antidoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación o ingestión, conseguir asistencia médica y presentar etiqueta del producto

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 / Teléf del titular: (01) 611-0831 CISPROOLIIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuaque tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. TRIPLE LAVADO
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abeias y artrópodos benéficos.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos
- No contaminar ríos, estanques o arrovos con los desechos o envases vacios.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin

Medidas: 19.3 cm (ancho) x 6.3 cm (alto)

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CÁPSULA EN SUSPENSIÓN (CS)

Lambda-cyhalothrin Reg. POUA Nº 2180 - SENASA

Titular de Registro: ARYSTA LIEESCIENCE PERILS A C Formulador:

UPL LIMITED Importador v distribuidor: SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY SAC

NO CORROSIVO

Fecha de Formulación: No. de Lote:

Composición:

CONTENIDO NETO: 0.2 Fecha de vencimientos

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

..250 a/L

.c.s.p 1L

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TRINICA 250 CS es un insecticida del grupo de los piretroides que actúa por contacto e ingestión, a nivel del sistema nervioso del insecto, a través de los canales de sodio, produciendo sobre-excitación nerviosa y luego la muerte

TRINICA 250 CS, se prepara diluvendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Mantener el caldo en constante agitación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C.	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	ml/200L	(días)	(ppm)
Cebolla	Thrips	Thrips tabaci	0.025	25	14	0.1

LMR: Límite mávimo de residuos

ERECLIENCIA V ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Aplicar previa evaluación de la plaga.

P.C.: Periodo de carencia

- Para el cultivo de cebolla se recomienda aplicar como máximo 2 veces por campaña, es decir
- como máximo aplicar 0.05 L/200L y siempre previa evaluación. - Peligroso para abeias.

PERIODO DE REINGRESO: Reingresar a la zona tratada después de 24 horas

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneia de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuniquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



































"I FA CUIDADOS AMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECALICIONES Y ADVERTENCIAS DE LISO Y APLICACIÓN

- DAÑINO. No ingerir v evitar la respiración (aspersión).
- Causa irritación moderada a los ojos
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos medicinas bebidas ni forraies

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Piretroide
- No existe antidoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación o ingestión conseguir asistencia médica y presentar etiqueta del producto

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 / Teléf del titular: (01) 611-0831 CISPROOLIIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuaque tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. TRIPLE LAVAGO
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abeias y artrópodos benéficos.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arrovos con los desechos o envases vacios.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin

Medidas: 19.3 cm (ancho) x 6.3 cm (alto)

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA CÁPSULA EN SUSPENSIÓN (CS

Composición Lambda-cyhalothrin.

Reg. PQUA Nº 2180 - SENASA

ARYSTA LIFESCIENCE PERUS A C Formulador: LIPI LIMITED

Importador y distribuidor: DEMETRA GROUP SAC

Fecha de Formulación: No. de Lote:

Titular de Registro:

CONTENIDO NETO: 0.26 Fecha de vencimientos

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

..250 a/L

csn1l

INSTRUCCIONES DE LISO Y MANEJO

TRINICA 250 CS es un insecticida del grupo de los piretroides que actúa por contacto e ingestión, a nivel del sistema nervioso del insecto, a través de los canales de sodio, produciendo sobreexcitación nerviosa y luego la muerte.

TRINICA 250 CS, se prepara diluvendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Mantener el caldo en constante agitación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C.	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	ml/200L	(días)	(ppm)
Cebolla	Thrips	Thrips tabaci	0.025	25	14	0.1

P.C.: Periodo de carencia LMR: Límite mávimo de residuos

ERECLIENCIA V ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Aplicar previa evaluación de la plaga.
- Para el cultivo de cebolla se recomienda aplicar como máximo 2 veces por campaña, es decir
- como máximo aplicar 0.05 L/200L y siempre previa evaluación. - Peligroso para abeias.

PERIODO DE REINGRESO: Reingresar a la zona tratada después de 24 horas

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneia de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuniquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



































