

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El producto es nocivo por ingestión y contacto con la piel.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Piretroide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- Teléfonos de Emergencia: CICOTOX: 328 7700  
 ESSALUD: 411 8000 opción 4; CISPROQUIM: 0800 50847
- Antídotos: no hay antídoto específico.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para las abejas.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

# Pointerex® 10 CE

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**COMPOSICION:**

Alpha-cypermethrin ..... 100 g/L  
 Aditivos..... c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 346 - SENASA

**Titular de Registro:**

**POINT ANDINA S.A.**  
 Calle Loreto 304.  
 Urb. Santa Patricia  
 II Etapa. La Molina. Lima-Perú.  
 Telf.: 348-1018



**Point**  
 ENTREGAMOS CALIDAD

**Formulado por:**

**POINT AGRO-CHINA LIMITED**  
 Whan Shi Town,  
 Yixing Jiansu 214217, China



**Importado y Distribuido por:**  
**SANIVEG PERU S.A.C**

Av. San Jenaro 235. Urb. Industrial.  
 Puente Piedra, Lima

**Contenido neto: 1 L**

Lote No.:  
 F de Formulación:  
 F. de Vencimiento:



**INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
 DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**POINTEREX 10CE** es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión, empleado en el control de las plagas recomendadas en esta etiqueta. Para su preparación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico tratando de efectuar una aplicación uniforme.  
 Se recomienda que diluido el producto no puede ser almacenado por más de 12 horas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"**

Cultivos	PLAGA		Dosis ml/200 L	P. C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico			
Alfalfa	Gusano ejército	<i>Spodoptera peruviana</i>	125	14	0,5
Algodón	Gusano rosado de la India	<i>Pectinophora gossypiella</i>	125	14	0,1
	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	125	14	0,1
Col	Gusano de la col	<i>Plutella spp</i>	125	14	1
Frijol	Gusano medidor de la hoja	<i>Pseudoplusia spp</i>	150	14	0,05
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	125	14	0,05
Papa	Mosca minadora (adultos)	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	100	14	0,05
Sandia	Perforador de guías	<i>Diaphania spp</i>	125	14	0,05
Tomate	Oruga minadora de la hoja y tallo	<i>Scrobipalpula absoluta</i>	150	14	0,1

P.C.: Periodo de Carencia. LMR: Limite máximo de Residuos (partes por millón).

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN.**- Se recomienda aplicar cuando se observe las primeras posturas y/o larvas.

Numero máximo de aplicaciones: 4 campaña/año

**PERIODO DE REINGRESO.**- Como mínimo 24 horas.

**COMPATIBILIDAD.**- No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

**FITOTOXICIDAD.**- No es fitotóxico usado a la dosis recomendada en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL.**- El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

