

CASCABEL 90PS®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA


POLVO SOLUBLE - SP

COMPOSICIÓN

Methomyl 900 g/kg
Aditivos.....c.s.p.1 kg

Reg. PQUA N°130 - SENASA

VENTA CON PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO



Point
ENTREGAMOS
CALIDAD

Titular de Registro:
POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto 304.
Urb. Sta. Patricia II Etapa
La Molina. Lima, Perú.
Teléfono: 348-1018

Formulado por:
POINT AGRO-CHINA LIMITED
Wan Shi Town,
Yixing, Jiangsu, 214217 China



Importado y Distribuido por:
SANIVEG PERU S.A.C
Av. San Jenaro 235. Urb.
Industrial.
Puente Piedra, Lima

CONTENIDO NETO: 1 kg

Lote N°:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

**ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO**

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO “MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Almacenar y transportar en lugar sombreado, seco y ventilado, en sus envases originales y bien cerrados.
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Evite su almacenamiento y transporte junto a productos alimenticios o medicinas de uso humano o veterinario.
- No contaminar los ríos, lagos o fuentes de agua.
- Usar guantes, máscara, gafas protectoras y mameluco con protector plástico durante la preparación y aplicación del producto.
- Peligroso para peces, abejas y otras formas de vida silvestre.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Carbamatos.
En caso de intoxicación, llamar al médico. Provocar el vómito si está consciente y luego aplicar tratamiento sintomático y de sostén. Al contacto con la piel y los ojos, lavarlos rápidamente con abundante agua limpia y jabón.

Cuando hay síntomas de intoxicación aplicar sulfato de atropina en forma intravenosa o intramuscular 1 - 2 mg en adultos, repetir si es necesario.

Teléfonos de emergencia:

CICOTOX: 328 7700
ESSALUD: 411 8000 opción 4
CISPROQUIM: 0800 50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No utilizar este envase para conservar alimentos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
- Peligroso para invertebrados acuáticos no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre.
- No aplicar el producto en suelos con napa freática superficial.
- Respetar una banda de protección hacia fuentes de agua de al menos 5 metros.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CASCABEL 90 PS es un insecticida en polvo del grupo de los carbamatos que actúa por contacto e ingestión. Es un insecticida de amplio espectro de acción, que altera las funciones neurofisiológicas de los insectos. Aplicar con cualquier equipo de aspersión, tratando de lograr una cobertura uniforme.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	kg/ha	g/cil		
Alcachofa	"Gusano perforador grande de la bellota"	<i>Heliothis virescens</i>	0.4	200	N.d	0.2
Cebolla	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	0.4-0.6	200-300	7	0.2
Espárrago	"Gusano perforador grande de la bellota"	<i>Heliothis virescens</i>	0.4	200	1	2
Maíz	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.5-0.6	250-300	7	0.1
Pimiento	"Gusano perforador grande de la bellota"	<i>Heliothis virescens</i>	0.4	200	3	1
Pimiento	"Polilla (gusano del fruto)"	<i>Symmetrischema capsicum</i>	0.4	200	3	1
Tomate	"Caballada (gusano ejército)"	<i>Spodoptera eridania</i>	0.4	200	7	1

P.C.: Período de carencia. L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (partes por millón)
N.d: No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar en cualquier etapa del cultivo. Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:

No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD:

CASCABEL 90 PS es compatible con plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina o los compuestos de cobre

FITOTOXICIDAD:

CASCABEL 90 PS no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en las etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones dadas.

