

04.01.22

CHAMPION®

CHAMPION®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN

Copper hydroxide 770 g/kg
Aditivos..... c.s.p. 1 kg
Equivalente a 500 g/kg de cobre metálico

PQUA Nº 2601 - SENASA

Titular del Registro: SERFI S.A.

Formulador:

Quimetal Industrial
Los Yacimientos 111
Maipú - Santiago
Chile

Importado y Distribuido por:
Serfi
Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima-Perú
Teléfono 51 (1) 710-4068

Contenido Neto: 500 g

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Causa daño temporal a los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con los alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido el plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Sales de Cobre.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito, no administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminados. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
SERFI S.A.: (01) 710-4068

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas o funguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa o tándola. Entregue el envase vacío en el lugar que no dispones por la autoridad competente, para su gestión.

PRECAUCIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para abejas.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CHAMPION es un fungicida de contacto y preventivo. Los iones de cobre son absorbidos por las esporas de hongos a medida que se van absorbiendo, el cobre altera los sistemas enzimáticos del patógeno provocando su muerte.

CHAMPION se usa en su formulación con los equipos de uso común en buen estado y en buenas condiciones.

Para la dosis usar un envase de agua, tal modo que se forme una suspensión uniforme, luego agregar ésta al volumen de agua.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Como medida general recomendamos iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad (alta humedad relativa).
- Mandarino, paltó: Realizar máximo una (01) aplicación por campaña, una (01) campaña al año.
- Café: Máximo una (01) aplicación por campaña considerando una (01) campaña al año.
- Espárrago: Máximo una (01) aplicación por campaña considerando dos (02) campañas al año. El intervalo entre aplicaciones puede variar entre 7 y 21 días.
- Papa, tomate: Aplicar hasta dos (02) aplicaciones por campaña considerando una (01) campaña al año. Intervalo entre aplicaciones entre 7 y 14 días.

PERIODO DE REINGRESO

- 24 horas

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

COMPATIBILIDAD

CHAMPION es compatible con la ayuda de los agroquímicos de uso convencional, excepto con aquellos de naturaleza ácida. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	kg/200L	kg/ha		
Café	Roya Amarilla	<i>Hemileia vastatrix</i>	0,6 - 1,0	3,0 - 5,0	14	50
Cebolla	Mildiu	<i>Petersonia destructor</i>	0,5 - 0,6	1,1-1,4	3	5
		<i>Cercospora asparagi</i>	0,6 - 0,7	1,2 - 2,1	14	5
Espárrago	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0,6	0,8 - 1,2	14	5
		<i>Cephalosporium virescens</i>	0,6 - 0,7	5,0 - 7,0	21	20
		<i>Botrytis cinerea</i>	0,9	3,6 - 4,0	21	20
Mandarina	Podredumbre gris	<i>Mycosphaerella citri</i>	0,25	2,3	21	20
		<i>Cephalosporium virescens</i>	0,6 - 0,7	5,0 - 7,0	7	20
Paltó	Algas	<i>Cladosporium herbarum</i>	0,5	1,8 - 2,0	7	20
		<i>Phytophthora infestans</i>	0,6 - 1,0	1,5 - 3,0	14	5
Papa	Hielo o fancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0,6 - 1,0	1,5 - 3,0	7	5
Tomate	Hielo	<i>Phytophthora infestans</i>	0,6 - 1,0	1,5 - 3,0	7	5
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	0,5	2,0	2	50

PC: Periodo de carencia.

LMR: Límite máximo de residuos.



MV PRODUCCIONES GRAFICAS

