

04.01.22

CHAMPION®

CHAMPION®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN

Copper hydroxide 770 g/kg
Aditivos..... c.s.p. 1 kg
Equivalente a 500 g/kg de cobre metálico

PQUA N° 2601 - SENASA

Titular del Registro: SERFI S.A.

Formulador:
C. Metal Industrial SA
Los Yacimientos 1301
Maipú - Santiago
Chile

Importado y Distribuido por:



Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima-Perú
Teléfono 51 (1) 710-4068

N° Lote:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

Contenido Neto: 1kg

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

CONDICIONES DE MANEJO DE DISPOSICIÓN DE
DE RESIDUOS Y ENVASES VACÍOS

El envase que haya contenido plaguicidas no debe reutilizarse. Después de usar el contenido cortar la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para abejas.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”.

“MANEJEBAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CHAMPION es un fungicida de contacto y preventivo. Los iones de cobre son absorbidos por las esporas de hongos a medida que crecen. Una vez absorbido, el cobre altera los sistemas enzimáticos del patógeno provocando su muerte. CHAMPION se usa en pulverización con los equipos de uso común en buen estado de conservación.

Verter la dosis a usar en un envase de agua, tal modo que se forme una suspensión uniforme, luego agregar ésta al volumen de agua.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Como medida general recomendamos iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales, favorezcan el desarrollo de la enfermedad (alta humedad relativa).
- Mandarino, palto: Realizar máximo una (01) aplicación por campaña, una (01) campaña al año.
- Café: Máximo una (01) aplicación por campaña considerando una (01) campaña al año.
- Espárrago: Máximo una (01) aplicación por campaña considerando dos (02) campañas al año. El Intervalo entre aplicaciones puede variar entre 14 y 21 días.
- Papa, tomate: Aplicar hasta dos (02) aplicaciones por campaña considerando una (01) campaña al año. Intervalo entre aplicaciones entre 7 y 14 días.

- Vid: Hasta dos (02) aplicaciones por campaña considerando una (01) campaña al año. Intervalo entre aplicaciones como mínimo de 14 días.
- Cebolla: Hasta dos (02) aplicaciones al año, considerando una (01) campaña al año. Intervalo de aplicaciones como mínimo de 14 días.

PERIODO DE REINGRESO

- 24 horas

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

COMPATIBILIDAD

CHAMPION es compatible con la ayuda de los agroquímicos de uso convencional, excepto con aquellos de naturaleza ácida. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	kg/200L	kg/ha		
Café	Roya Amarilla	Hemileia vastratix	0,6 - 1,0	3,0 - 5,0	14	50
Cebolla	Mildió	Peronospora destructor	0,5 - 0,6	1-1,14	3	5
Espárrago	Cercosporiosis	Cercospora asparagi	0,6 - 0,7	1,2 - 2,1	14	5
	Mancha del peral	Stemphyllum vesicarium	0,6	0,8 - 1,2	14	5
Mandarina	Algas	Cephaleuros virescens	0,6 - 0,7	5,0 - 7,0	21	20
	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	0,9	3,6 - 4,0	21	20
	Mancha grasienta	Mycosphaerella citri	0,25	2,3	21	20
Palto	Algas	Cephaleuros virescens	0,6 - 0,7	5,0 - 7,0	7	20
	Cladosporium	Cladosporium herbarum	0,5	1,8 - 2,0	7	20
Papa	Hielo o Mancha	Phytophthora infestans	0,6 - 1,0	1,5 - 3,0	14	5
Tomate	Hielo	Phytophthora infestans	0,6 - 1,0	1,5 - 3,0	7	5
Vid	Mildió	Plasmopara viticola	0,5	2,0	2	50

PC: Periodo de carencia

LMR: Limite máximo de residuos.



MV PRODUCCIONES GRAFICAS

