

04.01.22 Tamaño: 14 x 22 cms

Tamaño: 14 x 22 cms

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

CHAMPION®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN

Copper hydroxide770 g/kg
 Aditivos..... c.s.p. 1 kg
 Equivalente a 500 g/kg de cobre metálico

PQUA N° 2601 - SENASA

Titular del Registro: SERFI S.A.

Formulador:
Quimetal Industrial SA
 Los Yacimientos 1301
 Maipú - Santiago
 Chile

Importado y Distribuido por:

Serfi
 Av. República de Panamá 2577
 La Victoria, Lima-Perú
 Teléfono 51 (1) 710-4068


N° de Lote
 Fecha de Form.
 Fecha de Verif.

Contenido Neto: 10 kg

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**

MV PRODUCCIONES GRAFICAS



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”.
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Causa daño temporal a los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con los alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido el plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Sales de Cobre.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico más cercano, lleve la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito, no administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuando los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y calzado contaminados. Lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire a la persona del área contaminada y trasládela a un ambiente ventilado.
- Brindar atención médica artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
 SERFI S.A.: (01) 710-4068

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para abejas.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidades de movimiento o es corrienta del producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CHAMPION es un fungicida de contacto y breve acción. Los iones de cobre son absorbidos por las esporas de hongos a medida que crecen. Una vez absorbido, el cobre altera los sistemas enzimáticos del patógeno provocando su muerte.

CHAMPION se usa en pulverización con los equipos de uso común en buen estado de conservación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Como medida general recomendamos iniciar las aplicaciones cuando observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad (alta humedad relativa).
- Mandarino, palto: Realizar máximo una (01) aplicación por campaña, una (01) campaña al año.
- Café: Máximo una (01) aplicación por campaña considerando una (01) campaña al año.
- Espárrago: Máximo una (01) aplicación por campaña considerando dos (02) campañas al año. El intervalo entre aplicaciones puede variar entre 14 y 21 días.
- Papa, tomate: Aplicar hasta dos (02) aplicaciones por campaña considerando una (01) campaña al año. Intervalo entre aplicaciones entre 7 y 14 días.
- Vid: Hasta dos (02) aplicaciones por campaña considerando una (01) campaña al año. Intervalo entre aplicaciones como mínimo de 14 días.
- Cebolla: Hasta dos (02) aplicaciones al año, considerando una (01) campaña al año. Intervalo de aplicaciones como mínimo de 14 días.

PERIODO DE REINGRESO

- 24 horas

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

COMPATIBILIDAD

CHAMPION es compatible con la ayuda de los agroquímicos de uso convencional, excepto con aquellos de naturaleza ácida. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	kg/200L	kg/ha		
Café	Roya Amarilla	<i>Hemileia vastratix</i>	0,6 - 1,0	3,0 - 5,0	14	50
Cebolla	Mildió	<i>Peronospora destructor</i>	0,5 - 0,6	1-1,14	3	5
Espárrago	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	0,6 - 0,7	1,2 - 2,1	14	5
	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0,6	0,8 - 1,2	14	5
Mandarina	Algas	<i>Cephaleuros virescens</i>	0,6 - 0,7	5,0 - 7,0	21	20
	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0,9	3,6 - 4,0	21	20
	Mancha grasienta	<i>Mycosphaerella citri</i>	0,25	2,3	21	20
Palto	Algas	<i>Cephaleuros virescens</i>	0,6 - 0,7	5,0 - 7,0	7	20
	Cladosporium	<i>Cladosporium herbarum</i>	0,5	1,8 - 2,0	7	20
Papa	Hielo o Ranca	<i>Phytophthora infestans</i>	0,6 - 1,0	1,5 - 3,0	14	5
Tomate	Hielo	<i>Phytophthora infestans</i>	0,6 - 1,0	1,5 - 3,0	7	5
Vid	Mildió	<i>Plasmopara viticola</i>	0,5	2,0	2	50

PC: Período de carencia.

LMR: Límite máximo de residuos.

