

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Use guantes, overol, protector de ojos y rostro. No aspire la neblina del producto.
- No coma, beba o fume durante su aplicación.
- Cámbiese de ropa después de aplicar el producto. Lávese con abundante agua y jabón.
- No arrojar los sobrantes ni lavar los equipos de aplicación en acequias, riachuelos, canales de regadío, etc.
- No ingerir el producto y evite el contacto con la piel y ojos, y la inhalación de la aspersión.
- Almacenar el producto en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa. Las temperaturas debajo de 0° C y arriba de 46° C pueden deteriorarlo.
- Se puede aplicar durante todo el ciclo del cultivo hasta el mismo día de la cosecha sin peligro de residuos indeseables.
- Los envases desocupados se deberán destruir de manera que queden inservibles y su eliminación final deberá ser la aprobada por la respectiva autoridad local.

PRIMEROS AUXILIOS

- Si este producto fuera ingerido, beber abundante agua e inducir al vómito.
- En caso de contacto con la piel, lavar completamente las áreas afectadas con agua y jabón; los ojos deben ser lavados con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, mientras se obtiene atención médica.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CISPROQUIM: 080-050-847.
FARMEX: (01) 630-6400.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Ningún envase que haya contenido el plaguicida debe reusarse.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. Peligroso para los peces.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora. No permitir animales en el área tratada.

TRIGGRR®

SUELO

**REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS
DE USO AGRÍCOLA**

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición:

Citoquininas (como kinetina) 0,04 g/L
Aditivo c.s.p. 1L

Reg. PBUA N° 210-SENASA

Titular del Registro:
FARMEX S.A.

**Contenido Neto:
1 Litro**



Formulado y Distribuido por:
FARMEX S.A.
Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7,
San Isidro, Lima - Perú.
Teléfono: (01) 630-6400.

N° de Lote:

Fecha de Fab.:

Fecha de Venc.:

NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE NO CORROSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- **TRIGGRR® SUELO**, es un regulador de crecimiento de plantas que se aplica al suelo o en el tratamiento de semillas, plántulas y esquejes, actúa como estimulante o acelerador del brotamiento si se emplea a las concentraciones y tiempos adecuados. Además, mejora la actividad microbiana del suelo dando como resultado un incremento significativo de los rendimientos.
- Las semillas deben sumergirse en la solución por el tiempo indicado, luego dejar secar y sembrar. Las plántulas deben sumergirse hasta el cuello de las mismas, impregnando las raíces y los esquejes hasta la yema axilar más cercana al corte. La aplicación al suelo se realiza con bomba de mochila u otros equipos de pulverización, agitando constantemente la solución. Puede hacerse en toda la superficie al momento de la preparación del terreno o en banda en el fondo de surco, al momento de la siembra.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

1. TRATAMIENTO DE SEMILLAS, ESQUEJES Y PLÁNTULAS

Cultivo	Concentración %	Tiempo de suspensión
Algodón (semilla)	200 mL/qq	Impregnación: 5 minutos
Ajo (bulbos)	1	1 – 2 minutos
Frijol (semilla)	100 mL/ 25 Kg	Impregnación: 5 minutos
Cebolla (plántulas)	1	5 minutos
Maiz (semilla)	100 mL/ bolsa de semilla	Impregnación: 10 minutos antes de la siembra

2. APLICACIÓN AL SUELO

Cultivo	L/ha	Momento de aplicación (Alternativa)
Algodón	1.5	A la preparación del terreno.
	1.0	Al momento de la siembra.
	1.0	Después del desahije o al primer cultivo.
Ajo	1.0	Al momento de la siembra
Papa	1.0	Al momento de la siembra con semilla brotada, antes de colocar la semilla.
Espárrago	1.0	Después de 10-12 días terminada la cosecha.
Tomate	1.0	Realizar la aplicación 15 días después del trasplante.
Vid	2.0	Aplicar luego de la elongación del raquis, durante el inicio del crecimiento de las bayas; realizar 2 aplicaciones, la segunda 7 días después.

PERÍODO DE REINGRESO. No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD. TRIGGRR® SUELO es compatible con la mayoría de plaguicidas y puede ser mezclado con insecticidas o fungicidas. Para comprobar la compatibilidad, mezclar en un recipiente cantidades proporcionales diluidas de TRIGGRR® SUELO y del otro plaguicida o sustancia afín. Agitar la mezcla y dejar reposar durante quince (15) minutos. La formación de un precipitado que no se dispersa indica la incompatibilidad de los productos.

FITOTOXICIDAD. No se ha reportado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL. El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



PRECAUCIÓN

