



**Consist®
Full**

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
-No debe transportarse ni almacenarse conjuntamente con productos alimenticios, bebidas, forrajes, medicinas, etc.
-No se debe comer, beber, ni fumar durante la aplicación.

-Después de terminada la aplicación deberá cambiarse de ropa y lavarse todas las partes del cuerpo expuestas con abundante agua y jabón.

-Evítese el contacto con la piel, ojos y ropa. Manéjese en envases originales, almacenándolo herméticamente cerrado en lugares frescos y secos alejado del alcance de los niños, personas irresponsables y animales.

-No contaminar las fuentes de agua.
-Causa irritación moderada a los ojos (usar gafas o protección ocular en la mezcla y aplicación).

-Es ligeramente irritante a las vías respiratorias.
-Evitar respirar la aspersión.
-Ligeramente irritante a la piel.

-No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada durante las primeras 12 horas. Usar lentes, máscara, guantes, botas, mameluco u overol completo, gorro.

PRIMEROS AUXILIOS:
Grupos químicos: Tebuconazole = Triazoles; Trifloxystrobin = Estrobirulinas

-En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

-Quite la ropa contaminada inmediatamente. Lave las partes contaminadas del cuerpo con agua y jabón.

-Lave los ojos contaminados con un chorro suave de agua pura por un lapso de 10 a 15 minutos.

-Mantenga al paciente animado, caliente, al aire fresco y en posición de descanso.

-Dé soporte respiratorio si es necesario. No induzca al vómito si el paciente está inconsciente.

-En caso de intoxicación o contaminación ocular o dermal, lavar con abundante agua y llevar el paciente al médico.

INDICACIONES PARA EL MÉDICO:

-Tratamiento sintomático y de sostén. Mantenga libres las vías respiratorias y si es necesario por medio de respiración controlada.

ANTÍDOTO: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:



**Consist®
Full**

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Gránulo Dispersable (WG)

Trifloxystrobin, 250 g/kg
Tebuconazole, 500 g/kg
Aditivos, c.s.p 1 kg

Reg. PQUA N

Titular del Registro:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 9. San Isidro.

Formulado por:
Bayer AG
Chem Park 41538
Dormagen
Alemania

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro. Lima-Perú
Telf: 2113800

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE
NO EXPLOSIVO**

**Contenido
Neto: 1 Kilo**

Lote N°

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

© = Marca Registrada del grupo Bayer



**Consist®
Full**

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

-Después de usar el contenido del envase, inutilicelo rompiéndolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

-No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
-No disponer con residuos municipales.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

-Peligroso para organismos acuáticos.

-No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.

-Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.

-En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

**Consist®
Full**

GENERALIDADES:

Consist Full es un fungicida sistémico, que posee dos ingredientes activos en la formulación que actúan de manera complementaria. Tebuconazole inhibe la biosíntesis de ergosterol y otros procesos enzimáticos de los hongos, mientras que Trifloxystrobin inhibe la respiración celular de los hongos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Aplicar al inicio de síntomas de la enfermedad. Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Es recomendable preparar previa mezcla en un volumen reducido de agua agitando completamente y luego agregar el resto del agua al tanque de aspersión. Se recomiendan 3 aplicaciones por campaña dentro de un programa de manejo integrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS			LMR (ppm)	PC (días)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/cil.	Kg/ha	%		
VID	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	--	0.3-0.375	0.02 - 0.025	2 **	14
	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	--	0.375	0.025		
PIMIENTO	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	--	0.25	0.05	Trifloxystrobin: 0.3 Tebuconazole: 0.5	N.d
ESPÁRRAGO	Mancha purpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	--	0.3	--	Trifloxystrobin: 0.02 Tebuconazole: 0.05	N.d
ALCACHOFA	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	--	0.3	--	Trifloxystrobin: 0.02 Tebuconazole: 0.5	21
ARROZ	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	--	0.2-0.25	--	Trifloxystrobin: 0.02 Tebuconazole: 2	21
TANGELO	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria alternata</i>	--	--	0.025	Trifloxystrobin: 0.3 Tebuconazole: 0.9	N.d
GRANADO	Alternaria	<i>Alternaria alternata</i>	--	--	0.03	Trifloxystrobin: 0.02 Tebuconazole: 0.05	20
CEBOLLA	Mancha purpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	--	0.3	--	Trifloxystrobin: 0.02 Tebuconazole: 0.05	14
MANGO	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	--	--	0.025	Trifloxystrobin: 0.5 Tebuconazole: 0.1	14
MAÍZ	Mancha del asfalto	<i>Phyllachora maydis</i>	--	0.1	--	Trifloxystrobin: 0.02 Tebuconazole: 0.2	14
PAPA	Alternaria	<i>Alternaria solani</i>	--	0.3	--	Trifloxystrobin: 0.02 Tebuconazole: 0.2	14
CAFÉ	Roya amarilla	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.2	--	0.1	Trifloxystrobin: 0.05 Tebuconazole: 0.1	14
ARÁNDANOS	Alternaria	<i>Alternaria tenuissima</i>	--	--	0.025	Trifloxystrobin: 2 Tebuconazole: 2	3

Vid: Considerar un gasto de agua de 1500 l/ha. Arroz: Considerar un gasto de agua de 180 l/ha.

** Para ambos ingredientes activos.

PC = Período de carencia(días) LMR = Límite máximo de residuos (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar 2 aplicaciones por campaña. Realizar aplicaciones preventivas.

PERÍODO DE REINGRESO: 12 horas después de aplicado en el campo.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de productos químicos de uso agrícola, sin embargo es conveniente previo a hacer la mezcla corroborar la compatibilidad entre ambos productos.

FITOTOXICIDAD:

En los cultivos recomendados siempre realizar pruebas de fitocompatibilidad ya que cada variedad puede reaccionar de manera diferente.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

