

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGA EL PRODUCTO BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

FOLPAN® 50 PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición Química:

Folpet 500 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg N° 348-97-AG-SENASA

Contenido neto: 20 Kilogramos

Lote N°

Fecha de Vencimiento:

Fecha de Formulación:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Titular del Registro:

ADAMA Agriculture Perú S.A.

Av El Derby N° 254 Of. 503.

Santiago de Surco. Lima - Perú.

Teléfono: (01) 641-0000

Importado y Distribuido por:

AGROKLINGE S.A.

Calle Rene Descartes 311.

Urb.Santa Raquel II Etapa. Ate. Lima

Formulado por:

ADAMA Makhteshim Ltd

P.O. Box 60, Beer Sheva 841001.

Israel.



ADAMA



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto causa daño temporal a los ojos.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto en lugares frescos y ventilados, lejos de la pared y sobre una parihuela.
- No almacenar el producto en casas de habitación.
- Utilizar equipo de protección durante la mezcla y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No re-envasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de presentarse síntomas de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos. Si el dolor persiste consultar con un oftalmólogo.
 - En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar toda la zona expuesta al producto con jabón suave y agua; a continuación enjuague con agua tibia. Consulte a un médico en caso de cualquier complicación.
 - En caso de ingestión, no induzca al vómito. Lavar la boca con agua abundante. No administre nada oralmente si el paciente esta inconscientes.
 - Consulte a un médico.
- En caso de inhalación, sacar a la víctima al aire libre y mantenerla abrigada y en reposo. Si se ha producido paro respiratorio dar respiración artificial. Si la respiración es dificultosa dar oxígeno. Llamar al médico.

NOTA AL MÉDICO:

Se desconoce antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria. En caso de ingestión hacer lavado gástrico y administrar carbono activado.

●TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas): CISPROQUIM 080-050847; INFOSALUD: 0800-10-828; CICOTOX: 0800-13040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos vacíos
- No aplicar a menos de 5 m de las fuentes de agua en los cultivos anuales recomendados y no menos de 10 m en el cultivo de vid.
- No lavar el equipo ni la ropa utilizada en la aplicación de **FOLPAN 50 PM** en lugares cercanos a fuentes de agua.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o los sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FOLPAN 50 PM es un fungicida no sistémico de amplio espectro de acción, que se utiliza en aplicaciones preventivas para el control de patógenos foliares, de flores y de frutos. Debido a que este producto actúa sobre varios sitios de acción en el hongo, la probabilidad de aparición de resistencia es baja. El ingrediente activo de **FOLPAN 50 PM** se degrada rápidamente en el medio ambiente no dejando residuos tóxicos.

Preparar una pre-mezcla diluyendo la dosis recomendada en un recipiente con agua, llevar esta solución al cilindro o mochila según sea el caso y completar con agua hasta alcanzar el volumen requerido, agitar continuamente y proceder a la aplicación.

FOLPAN 50 PM se aplica con cualquier equipo de pulverización terrestre de mochila a palanca o motor, o con dispositivos adaptados al tractor. Calibrar los equipos para evitar sobre o sub-dosificaciones. Realizar la aplicación con gotas finas y cobertura uniforme.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de Usos

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/200L	Kg/ha		
CEBOLLA	Mildió	<i>Peronospora destructor</i>	0.5	1.0-1.5	7	2
ALGODÓN	Oidiosis	<i>Erysiphe malachrae</i>	0.5-1.0	1.0-2.0	7	-
MARIGOLD	Tizon temprano	<i>Alternaria solani</i>	0.5	1.0-1.5	7	5
PAPA	Hielo (rancha)	<i>Phytophthora infestans</i>	1.0	2.0-3.0	7	5
	Tizon temprano	<i>Alternaria solani</i>				
TOMATE	Tizon temprano	<i>Alternaria solani</i>	0.5	1.0-1.5	7	5
	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	1.0-2.0		
VID	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5-1.0	1.5-2.0	7	25
ZAPALLO	Oidiosis	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	0.5-1.0	1.0-1.5	7	2

P.C.: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Realizar como máximo 3 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 7 días. Las aplicaciones deben realizarse de forma preventiva, antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad, cuando las condiciones climáticas favorezcan su desarrollo.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al área tratada, sin ropa de protección, durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Compatible con la mayoría de plaguicidas agrícolas de uso común, salvo aquellos fuertemente alcalinos. No se debe emplear en combinación con aceite o poco después de la aspersión de aceite.

FITOTOXICIDAD:

No se han observado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos y dosis recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

