

**LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (vapor o aspersión).
- El contacto repetido puede causar reacciones alérgicas a ciertas personas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Urea
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca manteniendo el párpado bien abierto por lo menos 15 minutos, acuda a un médico. Si el contacto fuese con la piel retírese la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- Nota al médico: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.
- **TÉLFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas): CISPROQUIM 080-050847; INFOSALUD: 0800-10-828; CICOTOX: 0800-13040**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- En caso de derrame absorber el producto con arena u otro material inerte y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Linurex® 50 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA HERBICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN

Linuron 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 2275-SENASA

Titular de Registro,
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of 503.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000



ADAMA

Formulado por:
ADAMA Agan Ltd.
Northern Industrial Zone,
P.O. Box 262, Ashdod 77102, Israel.

Importado y Distribuido por:
AGRO KLINGE S.A.
Calle Rene Descartes 311.
Urb. Santa Raquel II Etapa. Ate. Lima



CONTENIDO NETO: 1 Litro

Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Linurex 50 SC es un herbicida selectivo, recomendado para el control de malezas anuales de hoja ancha y gramíneas, que se le aplica en pre-emergencia o post-emergencia.

Linurex 50 SC se aplica con equipos pulverizadores terrestres de alto volumen y boquillas de abanico plano. Agitar el envase para asegurar la uniformidad del contenido. Durante la preparación de la mezcla y aplicación del producto mantener en marcha el sistema de agitación. Antes de iniciar la aplicación asegurarse que el terreno este limpio de rastrojos, bien mullido, firme y sin terrones. Utilizar las dosis mas bajas en suelos ligeros y la más alta en suelos pesados.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Malezas		Dosis		PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/ha)	(L/200L)		
Espárrago	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>	1.0	-	1	7.0
	Hierba de gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>				
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>				
	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>				
Frijol	Chamico	<i>Datura stramonium</i>	1.0-1.5	-	n.a.	0.05
Mandarina	Rabo de zorro	<i>Setaria parviflora</i>	3.0-4.0	-	15	0.05
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>				
Manzano	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>	3.0-4.0	-	15	0.05
	Capuli cimarrón	<i>Nicandra physalodes</i>				
Alcachofa	Yuyo hembra	<i>Amaranthus viridis</i>	-	0.4	n.a.	0.05
	Capuli cimarrón	<i>Nicandra physalodes</i>				
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				
	Yuyo hembra	<i>Amaranthus viridis</i>				
Pimiento	Capuli cimarrón	<i>Nicandra physalodes</i>	-	0.1	n.a.	0.05
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				
	Hierba de gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>				
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>				

LMR: Límite Máximo de Residuos P.C.: Período de Carenia
n.a.: No Aplica (ver Hoja Informativa - Frecuencia y Época de Aplicación)

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



Dimensiones: 288 mm x 140 mm

Esta etiqueta requiere Hoja Informativa