LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (vapor o aspersión).
- El contacto repetido puede causar reacciones alérgicas a ciertas personas.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área en las primeras 12 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No desatorar las boquillas con la boca.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para envasar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Urea
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca manteniendo el párpado bien abierto por lo menos 15 minutos, acuda a un médico. Si el contacto fuese con la piel retírese la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones. Lavar la boca con abundante agua. Acuda a un médico.
- En caso de inhalación, llevar a la víctima al aire libre. En caso de presentarse problemas respiratorios, brindar respiración artificial. Acuda a un médico.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas): CISPROQUIM 080-050847; INFOSALUD: 0800-10-828; CICOTOX: 0800-13040
- Nota al médico: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas): CISPROQUIM 080-050847; INFOSALUD: 0800-10-828; CICOTOX: 0800-13040**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame absorber el producto con arena u otro material inerte y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Linurex®
50 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:
Linuron ..... 500 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 2275-SENASA

Titular de Registro,
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of 503.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000

ADAMA

Formulado por:
ADAMA Agan Ltd.
Northern Industrial Zone
P.O. Box 262
Ashdod 7710201, Israel

Importado y Distribuido por:
AGRO KLINGE S.A.
Calle Rene Descartes 311.
Urb. Santa Raquel II Etapa. Ate. Lima

AgroKlinge
a member of ADAMA

CONTENIDO NETO: 200 Litros
Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Linurex 50 SC es un herbicida selectivo, recomendado para el control de malezas anuales de hoja ancha y gramíneas, que se le aplica en pre-emergencia o post-emergencia.

Linurex 50 SC se aplica con equipos pulverizadores terrestres de alto volumen y boquillas de abanico plano. Agitar el envase para segurar la uniformidad del contenido. Durante la preparación de la mezcla y aplicación del producto mantener en marcha e sistema de agitación. Antes de iniciar la aplicación asegurarse que el terreno este limpio de rastrojos, bien mullido, firme y sin terrones. Utilizar las dosis mas bajas en suelos ligeros y la más alta en suelos pesados.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Malezas		Dosis		PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre Comun	Nombre Cientifico	(L/ha)	(L/200L)		
Espárrago	Yuyo Hierba de gallinazo Amor seco Cadillo	*Amaranthus dubius* *Chenopodium murale* *Bidens pilosa* *Cenchrus echinatus*	1.0	-	1	7.0
Frijol	Chamico	*Datura stramonium*	1.0-1.5	-	n.a.	0.05
Mandarina	Rabo de zorro Pata de gallina	*Setaria parviflora* *Eleusine indica*	3.0-4.0	-	15	0.05
Manzano	Cadillo Capuli cimarrón	*Cenchrus echinatus* *Nicandra physalodes*	3.0-4.0	-	15	0.05
Alcachofa	Yuyo hembra Capuli cimarrón Verdolaga	*Amaranthus viridis* *Nicandra physalodes* *Portula oleracea*	-	0.4	n.a.	0.05
Pimiento	Yuyo Capuli cimarrón Verdolaga Yuyo hembra Hierba de gallinazo Pata de gallina	*Amaranthus dubius* *Nicandra physalodes* *Portulaca oleracea* *Amaranthus viridis* *Chenopodium murale* *Eleusine indica*	-	0.1	n.a.	0.05

LMR: Límite Máximo de Residuos P.C.: Periodo de Carencia
n.a.: No Aplica (ver Frecuencia y Época de Aplicación)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Número máximo de aplicaciones por campaña: Una (01).
Espárrago: En pre-emergencia y post emergencia temprana con malezas de no más de 10 cm de altura.
Frijol: En pre-emergencia luego de la siembra.
Alcachofa y pimiento: En pre y post emergencia temprana después del transplante.
Mandarina y Manzano: En pre y post emergencia, a partir del tercer año.

PERIODO DE REINGRESO

Se podrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 12 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con herbicidas a base de atrazina, trifluralina, paraquat y glufosinato de amonio. Sin embargo se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a los cultivos y dosis recomendadas. No aplicar en presencia de viento fuerte.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

Dimensiones: 330 mm x 200 mm