

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA  
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Anilina Pirimidina
- No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y mostrar la etiqueta.

TELEFONOS DE EMERGENCIA: SAMU:106; CISPROQUIM: 0800-50847;  
POINT ANDINA S.A: (01) 348- 1018 ó 349-9609

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. • Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos. • No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. • No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. • Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. • El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. • En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# FASTER® 40SC

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### FUNGICIDA AGRÍCOLA

#### SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

#### COMPOSICIÓN:

Pyrimethanil ..... 400 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2552 - SENASA

Titular del registro: POINT ANDINA S.A.

Importado y distribuido por:  
POINT ANDINA S.A.

Calle Los Tulpanes 147 Oficina 701-B.  
Santiago de Surco, Lima – Perú.  
Teléfono: 348 1018/349-9609

Formulado por:  
YIXING XINGNONG CHEMICAL  
PRODUCTS CO., LTD.

Wanshi Town Yixing City Jiangsu Province, B.  
China 214217. Teléfono: (86-510) 87851001

Contenido Neto: 500 ml

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**FASTER 40 SC** es un fungicida de contacto con acción traslaminar, cuyo ingrediente activo pertenece al grupo de los Anilina Pirimidina. El mecanismo de acción del pyrimethanil consiste en la inhibición de la síntesis de aminoácidos y proteínas, entre estos, la biosíntesis de la metionina y la secreción de enzimas hidrolíticas que degradan la pared celular y que son necesarias para el proceso de infección. Se aplica en aspersión previa mezcla en agua. Se recomienda llenar el cilindro hasta la mitad y agregar la dosis recomendada de **FASTER 40 SC**; agitar continuamente y completar el resto con agua. Aplicar en aspersión con un equipo en perfecto estado y debidamente calibrado.

#### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO\*

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Fresa	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.20	7	5
Cebolla	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.25 - 0.30	7	0.2

PC: Período de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón)

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **FASTER 40 SC** cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones favorezcan la aparición de la enfermedad; se puede aplicar durante la etapa de floración y fructificación, respetando el período de carencia. Realizar como máximo 1 aplicación/campaña; considerando como máximo 3 campañas/año en el cultivo de fresa. Se recomienda una aplicación/campaña en el cultivo de cebolla, considerando 1 campaña/año. Realizar rotaciones con fungicidas de diferente modo de acción.

#### PERÍODO DE REINGRESO

48 horas después de aplicado el producto.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**Point**  
ENTREGAMOS  
CALIDAD

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

