

## LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de cuidado. No ingerir.

Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Conservarse el producto en envases originales, herméticamente cerrados.

Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.

Almacenar el producto bajo techo, en lugar fresco, seco y ventilado.

No almacenar, ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### INSTRUCCION DE PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo químico:** Hidrazine carboxilate

En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.

En caso de inhalación: mover a la persona a un área ventilada, dar respiración artificial si es necesario, llevar al paciente al médico.

En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón. Consultar al médico en caso de que aparezca irritación.

En caso de contacto con los ojos: mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15 minutos. Consultar con el médico.

En caso de ingestión: llamar al médico inmediatamente. No provocar el vómito. No administrar nada a una persona inconsciente.

Nota para el médico: tratar de acuerdo a los síntomas, no se conoce antídoto específico.

### TELEFONO DE EMERGENCIAS:

**SAMU: 106**

**ESSALUD: 411 – 8000, opción 4,**

**INTEROC S.A. (511) 614-5100**

### CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que hay tenido contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

Respetar una banda de no aplicación de 10 metros.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación, envases o sobrantes del producto. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.

No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

El producto no debe aplicarse en zonas de napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**BONUM®** tiene en su composición al ingrediente activo Thiabendazole, fungicida sistémico para el cultivo de fresa, actúa inhibiendo la división celular afectando el crecimiento del hongo.

Aplicar **BONUM®** en solución con agua de acuerdo al área a tratar. Llenar el tanque o cilindro hasta la mitad de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada de **BONUM®**, luego completar con agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

**BONUM®** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionada por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO                              | ENFERMEDAD         |                                 | DOSIS<br>(ml/200 L) | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
|                                      | NOMBRE COMUN       | NOMBRE CIENTIFICO               |                     |                |                 |
| Fresa<br>( <i>Fragaria vesca</i> )   | "Podredumbre gris" | <i>Botrytis cinerea</i>         | 200-250             | 14             | 0.1             |
| Palto<br>( <i>Persea americana</i> ) | "Muerte regresiva" | <i>Lasiodiplodia theobromae</i> | 150 - 200           | 15             | 15              |

PC = Período de Carencia

LMR = Límite Máximo Residuos.

### Desinfección de Semillas

| CULTIVO                              | ENFERMEDAD      |                           | DOSIS<br>(ml/200L) | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
|                                      | NOMBRE COMUN    | NOMBRE CIENTIFICO         |                    |                |                 |
| Papa<br>( <i>Solanum tuberosum</i> ) | "Rizoctoniasis" | <i>Rhizoctonia solani</i> | 600-800            | 90             | 15              |

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Para el cultivo de la fresa, realizar una aplicación por campaña, dos campañas al año durante el desarrollo y maduración del cultivo; para el cultivo del Palto se realizarán dos aplicaciones por campaña, una campaña al año, el intervalo entre aplicaciones es de 28 días; y para la desinfección de semillas en el cultivo de papa se considera una aplicación como máximo por campaña, una campaña al año.

### PERÍODO DE REINGRESO:

Se recomienda no ingresar al área tratada, sin equipo de protección, hasta las 24 horas después de la aplicación.

### COMPATIBILIDAD:

**BONUM®** puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Excepto con productos agentes oxidantes, agentes cáusticos fuertes y soluciones alcalinas.

### FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad de la dosis que se indica en la etiqueta.

### RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto".

