

# HOJA INFORMATIVA RETIRA 24 CM X 6 CM

6 cm

6 cm

6 cm

6 cm

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y otros artrópodos beneficiosos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para peces y organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios designados por las autoridades locales para este fin y evitar su lixiviación a aguas subterráneas.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- EVADE 20 SL es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión y presenta un movimiento sistémico y translaminar.
- EVADE 20 SL actúa sobre la transmisión de estímulos en el sistema nervioso central del insecto, inactivando a los receptores nicotínicos de acetilcolina en la membrana post-sináptica, de esta manera permite el paso continuo del estímulo ya que la actividad del neurotransmisor acetilcolina no se interrumpe dando como resultado una sobreexcitación, parálisis y muerte del insecto.
- EVADE 20 SL puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca

(mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación.

## “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

### CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina	“Queresa coma”	<i>Lepidosaphes beckii</i>	0.20-0.25	14	1
Arándano	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.10-0.15	1	2

PC: Periodo de Carencia  
LMR: Limite Máximo de Residuos.

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar al inicio de las infestaciones previa evaluación de la plaga en el cultivo y cuando las condiciones medioambientales sean las apropiadas para el desarrollo de la plaga.
- Realizar como máximo (1) aplicación de EVADE 20 SL por campaña.

## PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada, durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

## COMPATIBILIDAD

EVADE 20 SL es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de reacción alcalina y agentes fuertemente oxidantes. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

## FITOTOXICIDAD

EVADE 20 SL no es fitotóxico usado a la dosis recomendada, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

## RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

6 cm

