"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

EL TIGRE®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Bifenazate..... 500 g/kg
Aditivos..... c.s.p. 1kg

Reg. PQUA N° 2605- SENASA

Titular del registro: POINT ANDINA S.A.

Importado y distribuido por:
POINT ANDINA S.A.
Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.
Santiago de Surco, Lima – Perú.
Teléfono +51 (01) 348 1018

Formulado por:
POINT AGRO-CHINA Ltd
Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu, 214217 China
Tel. (86-510)8785 1001, Fax. 8785 1537

Point
ENTREGAMOS CALIDAD

Contenido Neto: 100 g

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIONES:
• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. • Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. • Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. • Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas. • No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. • Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
Grupo químico: Carbazate
• En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. • En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los parpados estén levantados. • En caso de ingestión no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones. • En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón. • En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
• Antídoto: este producto no tiene antídoto especifico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106;
POINT ANDINA S.A: (01) 348- 1018;
CISPROQUIM: 0800 50847

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: EL TIGRE es un acaricida selectivo que actúa por contacto y brinda un prolongado control residual. Interviene en el proceso de respiración de los ácaros, inhibiendo el transporte de electrones del complejo III mitocondrial, ocasionando el colapso y muerte del ácaro. Para su aplicación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, luego agregar la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda 1 aplicación/campaña/año para palto, fresa y mandarino. Se recomienda 2 aplicaciones campaña/año en vid, con un intervalo de 15 días entre aplicaciones. Aplicar cuando se observe los primeros signos de la plaga. Se recomienda alternar con productos de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO: No ingrese a las áreas tratadas hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas, salvo lo de fuerte reacción alcalina. Se recomienda realizar previamente una prueba de compatibilidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	Kg/200L		
Palto	Arañita roja	*Oligonychus punicae*	0.75	-	7	7
Fresa	Arañita roja	*Tetranychus urticae*	0.2 - 0.25	-	1	3
Vid	Arañita roja	*Tetranychus urticae*	-	0.10	14	0.7
Mandarino	Arañita roja de los cítricos	*Panonychus citri*	0.8	-	14	0.9

P.C.: Periodo de Carencia. L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (partes por millón).

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA